

水痘併發症

Complicated Varicella

一、臨床條件

具有下列任一條件：

- (一) 水痘併發症住院或死亡：急性發作，出現符合水痘表現之皮疹，且於發疹後因繼發性細菌感染、或肺部、神經等其它器官系統併發症而住院或死亡者。
- (二) 先天性水痘症候群：胎兒異常，或新生兒出生出現低體重 (small for gestational age)、依皮節分布癍痕性的皮膚病變及色素沉澱、先天性眼睛、腦部、骨骼及肌肉異常或缺陷等症狀。

二、檢驗條件

- (一) 臨床檢體（水疱液、痂皮、腦脊髓液、胎兒異常之孕婦羊水）分子生物學核酸檢測(PCR)陽性。
- (二) 血清學抗體檢測陽性：單一血清檢體 IgM 抗體陽性或急性期與恢復期之成對血清中 IgG 抗體顯著上升。

三、流行病學條件

母親於孕期曾感染水痘或接觸水痘患者。

四、通報定義

- (一) 符合臨床條件(一)。
- (二) 同時符合臨床條件(二)及流行病學條件。

五、疾病分類

- (一) 可能病例：
NA
- (二) 極可能病例：
NA
- (三) 確定病例：
 1. 符合臨床條件(一)。
 2. 同時符合臨床條件(二)、流病條件及任一檢驗條件。

水痘併發症檢體採檢與檢驗方法

採檢項目	採檢單位	檢體種類	採檢規定	運送條件	檢驗方法	檢驗期間	收件單位	備註
水痘併發症	全國各醫療院所	痂皮	將乾燥痂皮由皮膚取下置於無菌試管輸送	常溫	聚合酶連鎖反應(PCR)	3-5 工作日	疾病管制署 昆陽辦公室	
		水泡病灶拭子	以無菌針頭掀開水泡表層，以病毒拭子之採檢棒擦拭水泡基底皮膚後插入病毒保存輸送管	低溫				
		腦脊髓液	以無菌檢體小管收集 1 ml 腦脊髓液					
		羊水	以無菌試管收集 20 mL 羊水					
		血清	以無菌試管收 2 mL 血清	抗體檢測 (ELISA-IgM, ELISA-IgG)	7-10 工作日	疑似個案必要時得於距第一次採檢後 6 個月再採第二次血清送驗。		