

侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症 (Invasive Haemophilus influenzae Type b Infection)

一、臨床條件

由 b 型流行性感 冒嗜血桿菌所引起的侵襲性疾病，可能產生的臨床症狀包括：腦膜炎、菌血症、肺炎、蜂窩組織炎、敗血性關節炎、骨髓炎、會厭炎等。

二、檢驗條件

正常無菌檢體（血液、腦脊髓液、關節液、肋膜液、心包膜液等體液）分離並鑑定出 b 型嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae* type b）。

三、流行病學條件

曾經與確定病例或極可能病例具有密切接觸，即照護、同住、或與確定病例有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。

四、通報定義

符合臨床條件，且經醫院自行檢驗，符合檢驗條件。

五、疾病分類

（一）可能病例：

符合臨床條件。

（二）極可能病例：

NA

（三）確定病例：

符合臨床條件及檢驗條件。

六、檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時機	採檢規定	運送條件	注意事項
侵襲性 b 型嗜血桿菌感染症	全血	病原體檢測	未投藥前立即採檢	以採血管採全血，立即注入嗜氧性血瓶（血液與培養液比例為 1:5 至 1:10）。	常溫	<ol style="list-style-type: none"> 全血採檢請參考第 3.1 節。 腦脊髓液採檢步驟請參考第 3.6 節，由醫師採檢。 肋膜液、關節液等體液採檢請參考第 3.10 節。
	腦脊髓液、肋膜液、關節液等		未投藥前立即採檢	以無菌容器收集至少 1 mL 腦脊髓液或體液。或直接接種於巧克力培養基。		
	菌株	菌株鑑定	未投藥前立即採檢	接種於巧克力培養基，以封口膜（paraffin）密封，並加夾鏈袋運送。	常溫 (B 類感染性物質包裝)	