

## 18歲(含)以上未滿65歲高危險群13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)接種建議

- 一. 從未接種過：先接種1劑PCV13，間隔至少8週接種1劑PPV23，間隔至少5年再接種第2劑PPV23。
- 二. 接種過1劑PPV23：間隔至少1年再接種1劑PCV13；與PCV13間隔至少8週，且與前一劑PPV23間隔至少5年，再接種第2劑PPV23。
- 三. 接種過2劑PPV23：與前一劑PPV23間隔至少1年再接種1劑PCV13。
- 四. 接種過1劑PCV13：間隔至少8週再接種1劑PPV23，5年後再接種第2劑PPV23。
- 五. 接種過1劑PCV13與1劑PPV23：與前一劑PPV23間隔至少5年，再接種第2劑PPV23。

※高危險群包含下列六大類疾病：

- (1) 脾臟功能缺損或脾臟切除
- (2) 先天或後天免疫功能不全(含括愛滋病毒感染者)
- (3) 人工耳植入者
- (4) 慢性腎病變(含括腎病症候群)
- (5) 腦脊髓液滲漏
- (6) 接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者

## 附件

### 18歲(含)以上未滿65歲高危險群肺炎鏈球菌疫苗接種建議

| 過往接種史(劑次)          | 接續接種建議                |
|--------------------|-----------------------|
| 從未接種               | PCV13 → PPV23 → PPV23 |
| PPV23(1)           | → PCV13 → PPV23       |
| PPV23(2)           | → PCV13               |
| PCV13(1)           | → PPV23 → PPV23       |
| PCV13(1)+ PPV23(1) | → PPV23               |

**PCV13**=13價結合型肺炎鏈球菌疫苗；**PPV23**=23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗

註：

1. PCV13 → PPV23 間隔至少 8 週
2. PPV23 → PCV13 間隔至少 1 年
3. PPV23 → PPV23 間隔至少 5 年