

106年潛伏結核感染診斷及治療對象



擴大囉！



為什麼有些結核病患的接觸者要進行潛伏結核感染診斷及治療？

因為結核菌透過空氣傳播，高傳染性結核病患的接觸者（如共同居住、同班同學、同事等），有比較高的機會被傳染。被傳染成為潛伏結核感染，是不具傳染力的，但以後發病風險高。終生有10%機會發病成結核病。因此接觸者應進行潛伏結核感染診斷，了解是否感染。若感染及早接受預防性治療，可降低73-90%發病機率，以免傳染給摯愛的親人及朋友。



衛生局所為什麼通知您接受檢查？☆☆☆

106年起政府針對過去曾為高傳染性個案（痰塗片陽性且培養鑑定為結核分枝桿菌）的接觸者提供新的檢驗服務，當時未接受過潛伏結核感染檢驗者，可免費接受檢驗。衛生局(所)通知您，安排您接受檢驗，請持衛生局(所)開立之接觸者就醫轉介單，至指定醫院接受檢驗。



要做什麼檢驗？

- 未滿5歲者：皮膚結核菌素測驗
- 5歲以上者：抽血進行丙型干擾素釋放試驗



檢驗結果代表什麼意思？



陰性

目前未發現異常，建議您未來生活仍應保持營養均衡、住處通風良好。由於往後可能接觸到結核病人而不知道，所以若咳嗽超過兩週，請配戴口罩且立即就醫。



陽性

您可能感染結核菌，但請不要擔心，您不是病人，不具傳染力，但您需要接受預防性治療評估，降低發病機率。目前有2種治療處方：9個月每日服用「isoniazid」或3個月每週1次(共12次)「速克伏」短程處方，醫師會為您評估合適的處方。



不確定

約2%的人會出現不確定結果，可能是因為身體免疫狀況的關係，醫師會依據您的免疫狀況判斷是否重新抽血檢驗或是評估是否給予治療。



衛生福利部疾病管制署 關心您

