

潛伏結核感染治療處方一覽表：

處方別	9H	速克伏(3HP)	4R
處方藥品	Isoniazid (INH)	Isoniazid (INH) + Rifapentine (RPT)	Rifampin (RMP)
適用對象	<ul style="list-style-type: none"> <li>藥敏全敏感指標個案之接觸者適用</li> <li>RMP 抗藥且 INH 敏感指標個案之接觸者適用</li> </ul>	藥敏全敏感指標個案之接觸者適用	僅限 INH 抗藥且 RMP 敏感指標之接觸者使用
劑量	成人：5 mg/kg 兒童：10 mg/kg 最大劑量：300 mg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isoniazid：15 mg/kg (2-11 歲 25mg/kg) 最大劑量：900 mg</li> <li>Rifapentine： 10-14 kg_300mg 14-25 kg_450mg 25-32 kg_600mg 32-49 kg_750mg ≥50 kg _900mg 最大劑量：900 mg</li> </ul>	成人：10 mg/kg 兒童：10-20 mg/kg 最大劑量：600 mg
服藥頻次	每日	每週	每日
療程	270 天(9 個月)	12 個劑量(3 個月)	120 天(4 個月)
使用限制	INH 抗藥指標之接觸者不適用	未滿 2 歲接觸者、INH 或 RMP 抗藥指標個案之接觸者、孕婦或準備懷孕的婦女不適用	RMP 抗藥指標之接觸者不適用
加入都治計畫(DOPT)	建議	必須	必須