

# DTaP-IPV 接種實務 Q&A

**Q1. 滿 5 歲幼童接種之「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)」改為「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺 (DTaP-IPV)」之原因為何?何時實施?**

**A:** 本項疫苗轉換政策，是考量百日咳抗體易衰退，爰比照歐美先進國家，改以含全量百日咳成分之 DTaP-IPV 提供滿 5 歲以上的兒童使用，以提升百日咳疫苗的追加接種效果。預計於 106 年 10 月間各縣市接種單位的 Tdap-IPV 用畢後陸續實施。

**Q2. DTaP-IPV 與 Tdap-IPV 有何不同?**

**A:** 相較於 Tdap-IPV，DTaP-IPV 對百日咳能提供更佳的免疫保護力，除了少數滿 7 歲以上兒童接種後可能出現局部不良反應外，其餘與 Tdap-IPV 無異，請家長不用擔憂。

**Q3. DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項為何?**

**A:** DTaP-IPV 之接種禁忌及注意事項同 Tdap-IPV，說明如下：

## 接種禁忌

1. 先前接種白喉破傷風百日咳相關疫苗及小兒麻痺疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
2. 接種含百日咳疫苗後 7 天內曾發生腦病變，且無其他可解釋病因者。

## 注意事項

1. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜在醫師判斷病情已穩定後才注射疫苗。
2. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
3. 先前接種含破傷風疫苗後 6 週內曾發生過 GBS 者。
4. 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生 Arthus 過敏反應者，如果有必要追加含破傷風類毒素疫苗，應與前次接種間隔 10 年以上。
5. 不適宜接種本項疫苗之百日咳成分者，可改接種白喉破傷風混合疫苗 (DT/Td) 及不活化小兒麻痺疫苗 (IPV)。

**Q4. DTaP-IPV 可施打於入學後的兒童嗎?**

A:目前疾病管制署提供的 DTaP-IPV 為 Sanofi Pasteur 產製(品名：Tetraxim)，已核准「適用於出生 2 個月至未滿 13 歲孩童」，因此入學後兒童可以本項疫苗進行補種。

**Q5.兒童在國外已經打過 5 劑 DTaP，現在要打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV?**

A：如果兒童已經在國外依時程完成 5 劑 DTaP，或第 4 劑 DTaP 是在 4 歲後接種，就不用再打 DTaP-IPV 或 Tdap-IPV；但如果 IPV 只完成 4 劑，請在滿 5 歲入小一前再補種 1 劑 IPV。