黃熱病的預防方式

避免蚊蟲叮咬

- 穿著淺色長袖的衣褲、長襪及包鞋，裸露的皮膚使用含有DEET(待乙妥)成分的防蚊劑，並按照包裝說明，按時補擦。
- 選擇有紗窗紗門的飯店，睡覺時可使用蚊帳，必要時噴灑殺蟲劑。

預防接種

前往高風險地區旅客，建議至少提早10天接種疫苗，尤其預計在當地長期停留或有大量野外活動的旅客，更應該請醫師評估打疫苗的必要性。

黃熱病的入境預防接種規定

為避免黃熱病的跨國傳播，部分國家(見右表)會要求旅客必須在申請簽證或入境時出示黃熱病預防接種證明書。

各國高風險區認定、接種年齡限制略有不同，詳細規定請參考疾管署網站。相關規定可能隨時因疫情變化而有所調整，請以當地國家最新公告資訊為準。

境旅客都必須查驗預防接種證明書

非洲地區

安哥拉、貝南、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、中非共和國、象牙海岸、剛果民主共和國、加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、馬利、尼日、剛果共和國、盧安達、獅子山共和國、蘇丹、多哥

美洲地區

法屬蓋亞那

自其他高風險國家入境者，必須查驗預防接種證明書

亞洲地區

不丹、中國大陸、巴林、巴基斯坦、北韓、尼泊爾、伊拉克、伊朗、印尼、印度、吉爾吉斯、沙烏地阿拉伯、汶萊、孟加拉、東帝汶、阿曼、阿富汗、哈薩克、柬埔寨、約旦、泰國、馬來西亞、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、越南、新加坡、葉門、寮國、緬甸、黎巴嫩

大洋洲地區

巴布亞紐幾內亞、吉里巴斯、法屬玻里尼西亞、法屬新喀里多尼亞、英屬皮特凱恩群島、索羅門群島、紐埃、斐濟、澳大利亞、澳洲科科斯群島、澳洲聖誕島、澳洲諾福客島、諾魯、薩摩亞

美洲地區

千里達、厄瓜多、巴貝多、巴拉圭、巴哈馬、牙買加、瓜地馬拉、多米尼克、安地卡及巴布達、宏都拉斯、貝里斯、法屬瓜地洛普島、法屬馬丁尼克島、法屬聖巴泰勒米島、法屬聖馬丁、阿魯巴、玻利維亞、英屬安圭拉島、英屬特克斯及凱科斯群島、英屬聖赫倫那島、英屬蒙席雷特島、哥斯大黎加、格瑞那達、荷屬安第列斯群島、聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞、蓋亞那、墨西哥、薩爾瓦多、蘇利南

歐洲地區

阿爾巴尼亞、馬爾他

非洲地區

厄利垂亞、史瓦濟蘭、甘比亞、吉布地、衣索比亞、利比亞、赤道幾內亞、辛巴威、坦尚尼亞、奈及利亞、尚比亞、波札那、法屬留尼旺島、法屬馬約特島、肯亞、阿爾及利亞、南非、查德、突尼西亞、茅利塔尼亞、迦納、埃及、烏干達、索馬利亞、納米比亞、馬拉威、馬達加斯加、莫三比克、幾內亞、塞內加爾、塞席爾、聖多美普林西比、維德角、模里西斯、賴索托

2014年11月修訂

黃熱病

急性傳染病・預防須知

廣告

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC
疫情通報及諮詢專線：1922

黃熱病的流行地區



黃熱病流行地區集中在非洲及拉丁美洲。高風險國家地圖及列表如下，最新資訊及各國詳細風險說明，請參考疾管署網站（http://www.cdc.gov.tw）。

黃熱病高風險國家列表

非洲地區

安哥拉、貝南、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、中非共和國、象牙海岸、赤道幾內亞、加彭、甘比亞、迦納、幾內亞、幾內亞比索、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果共和國、南蘇丹共和國、盧安達、塞內加爾、獅子山共和國、多哥、烏干達、查德＊、剛果民主共和國＊、衣索比亞＊、肯亞＊、馬利＊、茅利塔尼亞＊、尼日＊、蘇丹＊

美洲地區

法屬蓋亞那、蓋亞那、巴拉圭、蘇利南、阿根廷＊、玻利維亞＊、巴西＊、哥倫比亞＊、厄瓜多＊、巴拿馬＊、秘魯＊、千里達＊、委內瑞拉＊

標註「＊」符號者，境內僅部分區域有感染風險。

認識黃熱病

病毒造成的感染症

黃熱病是由「黃熱病病毒」所造成的急性傳染病。

蚊子叮咬而傳播

人類主要是受帶病毒的蚊子叮咬而感染。

感染症狀

初期有發燒、肌肉痛、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，並可能併發肝功能異常。黃熱病症狀嚴重程度不一，部分患者可能症狀出現後數小時就進入危險期，出現出血徵候（如流鼻血、牙齦出血、吐血及黑便），甚至肝腎臟衰竭。致死率約為5%，流行期致死率可達20~40%。

潛伏期約3~6日

感染黃熱病後，約3~6天會出現症狀。

黃熱病疫苗簡介

黃熱病疫苗是一種活性減毒疫苗，接種後約7~10天可產生保護力，保護力可維持終身。但如果入境國家要求出示效期10年內的預防接種證明書，仍必須追加接種。

不可接種對象

- ■年齡未滿6個月的嬰兒、懷孕初期的孕婦
- ■免疫不全症患者，或正在接受免疫抑制劑或放射性治療者
- ■有胸腺疾病史，如胸腺瘤（thymoma）或曾接受胸腺切除術(thymectomy)者
- ■對雞蛋或疫苗成分過敏者
- ■高燒或罹患嚴重慢性疾病者

需特別留意的接種對象

- ■年齡6~9個月之間的嬰兒，60歲以上長者
- ■無病徵之愛滋病病毒感染者
- ■孕婦及哺乳中婦女

接種不良反應

- ■接種後5~10天可能出現頭痛、肌肉痛、輕微發燒等類似感冒症狀，症狀約1~2天會恢復。
- ■黃熱病疫苗曾通報嚴重的不良反應，造成接種者神經或臟器病變，但發生率極低(均小於十萬分之1)。接種後如持續不適，尤其屬於應特別留意對象者，應立刻就醫並通報原接種醫院。