

卡介苗接種敬告家長書

接種的目的

接種卡介苗可避免幼童發生嚴重結核病，研究顯示，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎的發生率約為百萬分之152.5，是有接種者的47倍，此類疾病若未及早診治會造成腦脊髓等不可逆病變(無法自理生活、智商受損等)，並伴隨約20%~40%致死率。

宜何時接種

若無接種禁忌症的嬰幼兒，宜於出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月)，至遲1歲前完成。倘至1歲以後才接種卡介苗，則於接種前必須先進行潛伏結核感染評估(另一種皮內注射檢查)，將更耗時費力，故請按建議時程進行接種。

接種後可能的不良反應

- 常見但不嚴重的不良反應：局部膿瘍、淋巴結炎等。
- 不常見但較嚴重的不良反應：骨炎/骨髓炎等。

我國自2007年起開始主動監測卡介苗不良反應，資料顯示骨炎/骨髓炎發生比率約百萬分之55，尚在世界衛生組織估計範圍內。

資料來源	副作用	骨炎/ 骨髓炎	瀰漫性 卡介苗感染
我國監測資料 (2008-2009年 出生世代)		55例/ 百萬人	0例/ 百萬人
世界衛生組織 2000年報告		2-700例/ 百萬人	2例/ 百萬人

5歲以前要注意的事

幼童如果出現局部膿瘍/腫脹等疑似卡介苗不良反應時，宜提醒醫師將卡介苗接種因素納入評估；或洽地方衛生局(所)協助轉介醫院小兒科診治(或請小兒科醫師進行會診)，以便進一步釐清病因。疑似/確認因接種卡介苗受傷害者，可透過接種地衛生局的說明與協助，申請預防接種受害救濟。

接種前

• 請先確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史(如幼年因不明原因感染而死亡)。另對於後天免疫不全病毒(HIV)感染母親所生之嬰幼兒，請諮詢感染科醫師後，始得接種。

接種時

• 出生滿5-8個月之嬰兒活動力佳，故須妥善固定嬰兒，以利進行卡介苗皮內注射，請家屬配合工作人員的專業指導，讓注射過程順利完成。

接種後

• 請家屬定期為嬰兒修剪指甲，接種後，以乾紗布覆蓋接種部位並以膠帶固定，或穿著有袖的衣服，以避免嬰兒抓傷接種部位，引發不必要的感染。

接種後正常情形

1-2週

注射部位會呈現一個小紅結節，之後逐漸變大，微有痛癢但不發燒。



4-6週

會變成膿瘍或潰爛，不必擦藥或包紮，只要保持清潔及乾燥，如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨，應避免擠壓。



2-3個月

會自動癒合結痂，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。



其他資訊

如果您需要其他卡介苗相關訊息，歡迎至衛生福利部疾病管制署全球資訊網<http://www.cdc.gov.tw>之傳染病介紹/結核病主題網查閱。

敬告家長書回條：

已詳閱「卡介苗接種敬告家長書」並已接受施打人員衛教指導

幼童姓名：_____ (或ooo之子女)

家長簽章：_____

施針者簽章：_____



衛生福利部疾病管制署關心您