

結核病 (Tuberculosis)

一、臨床條件

- (一) 接受抗結核藥物治療之結核病人。
- (二) 具有結核病之症狀、徵候或胸部 X 光顯示疑似結核病灶且醫師高度懷疑。

二、檢驗條件

- (一) 臨床檢體 (如痰、肋膜液、胃洗液、支氣管沖洗液、組織切片等) 結核菌培養陽性，鑑定為 *Mycobacterium tuberculosis complex* (不含 *Mycobacterium bovis* BCG)。
- (二) 臨床檢體 (如痰、肋膜液、胃洗液、支氣管沖洗液、組織切片等) 塗片抗酸菌染色檢查陽性，且檢體經 *Mycobacterium tuberculosis complex* 核酸偵測為陽性。
- (三) 組織切片顯示典型病理報告。
- (四) 臨床檢體塗片抗酸菌染色檢查陽性。

三、流行病學條件：NA

四、通報定義：

具有下列任一個條件：

- (一) 符合檢驗條件第一項或第二項，或
- (二) 符合臨床條件第一項，或
- (三) 符合檢驗條件第三項或第四項，且醫師高度懷疑，或
- (四) 符合臨床條件第二項。

五、疾病分類：

- (一) 可能病例：NA
- (二) 極可能病例：NA
- (三) 確定病例：

具有下列任一個條件：

1. 符合檢驗條件第一項或第二項，或
2. 符合臨床條件第一項且胸部 X 光進步或臨床症狀改善。

六、檢體採檢送驗事項

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時機	採檢規定	運送條件	注意事項
結核病 (除多重抗 藥性結核病 外)	痰液	病原體檢 測；藥物感 受性試驗	初次驗痰 (未服藥 前)	以 50mL 無菌離 心管收集 3-5mL 痰檢 體。	低溫	1. 建議採集 3 次檢 體，其中至少有 1 為清晨第 1 口痰檢 體。
	菌株	菌株鑑定； 藥物感受性 試驗	配合案例	詳本採檢手冊 3.15.2 菌株檢體	低溫 (A 類感染 性物質包 裝)	2. 痰檢體採集請參考 第 3.9 節。 3. 檢體與送驗單分別 以夾鏈袋包裝。