

# 萊姆病（Lyme Disease）

## 一、臨床條件

頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬、遊走性紅斑，病程進展到後期會出現神經根發炎。

## 二、檢驗條件

具有下列任一個條件：

（一）臨床檢體（皮膚病灶區之檢體或腦脊髓液、關節囊液等）分離並鑑定出伯氏疏螺旋體（*Borrelia burgdorferi*）。

（二）血清學抗體檢測陽性。

## 三、流行病學條件

NA

## 四、通報定義

符合臨床條件。

## 五、疾病分類

（一）可能病例：

NA

（二）極可能病例：

NA

（三）確定病例：

符合檢驗條件。

## 六、檢體採檢送驗事項

傳染病名稱	採檢項目	採檢目的	採檢時間	採檢量及規定	送驗方式	應保存種類 應保存時間	注意事項
萊姆病	皮膚傷口 (遊走性紅斑)	病原體 檢測	臨床診斷 為疑似病 例	以無菌刀片切 取病灶區外緣 往內側 0.5 cm 處之檢體，以無 菌生理食鹽水 沾濕之無菌紗 布包裹，再置於 無菌容器內。	22-35°C (B 類感 染性物質 包裝)	菌株 (30 日)	<ol style="list-style-type: none"> <li>血清檢體勿加入任何添加物。</li> <li>傷口採檢，請參閱傳染病檢體採檢手冊第 3.11 節。</li> <li>腦脊髓液採檢步驟請參閱傳染病檢體採檢手冊第 3.6 節，由醫師採檢。</li> <li>關節囊液採檢步驟請參閱傳染病檢體採檢手冊第 3.10 節，由醫師採檢。</li> <li>血清檢體請參閱傳染病檢體採檢手冊 2.8.3 及 2.8.4 備註說明，血清採檢步驟請參閱第 3.3 節。</li> </ol>
	腦脊髓液、關節囊液		臨床診斷 為疑似病 例	以無菌檢體小 瓶收集 0.5 mL 腦脊髓液或關 節囊液。			
	血清	抗體檢測	發病 8-30 日 內	以無菌試管收 集 3mL 血清。	2-8°C (B 類感 染性物質 包裝)	陽性血清 (30 日)	