

鼠疫

(Plague)

一、臨床條件

出現發燒、寒顫、頭痛、不適、虛脫及白血球增多，且伴隨下列一種（含）以上之主要臨床型態：

- (一) 局部淋巴腺炎（腺鼠疫）。
- (二) 沒有明顯淋巴腺腫之敗血症（敗血性鼠疫）。
- (三) 肺鼠疫：腺鼠疫或敗血性鼠疫經血行蔓延造成（次發性肺鼠疫）或吸入飛沫感染（原發性肺鼠疫）。
- (四) 由暴露於較大感染性飛沫或食入受感染組織（咽鼠疫）所造成之咽炎和頸部淋巴腺炎。

二、檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體（淋巴液、血液、痰液、咽喉擦拭液等）分離並鑑定出鼠疫桿菌（*Yersinia pestis*）。
- (二) 臨床檢體分子生物學核酸檢測陽性。
- (三) 血清學抗體檢測陽性：恢復期血清較急性期血清抗體效價 ≥ 4 倍上升。

三、流行病學條件

具有下列任一個條件：

- (一) 具有鼠疫流行地區之旅遊史，且曾接觸嚙齒類動物，或遭跳蚤叮咬。
- (二) 曾接觸鼠疫確定病例。

四、通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件及流行病學條件。
- (二) 經醫院自行檢驗，符合檢驗條件。
- (三) 醫師或法醫師高度懷疑。

五、 疾病分類

- (一) 可能病例： NA
- (二) 極可能病例：符合臨床條件雖未經實驗室證實，但與實驗室證實之確定病例 具有流行病學之關聯。
- (三) 確定病例：符合臨床條件及檢驗條件。

六、 檢體採檢送驗事項

請參閱「傳染病檢體採檢手冊」(<https://gov.tw/pK8>)