

# 淋病個案疫調單

## 一、風險管理個案類別

- ☐ 一年內重複感染淋病 2 次(含)以上之個案
- ☐ MDR(多重抗藥性)      ☐ XDR(廣泛抗藥性)
- ☐ 對 ceftriaxone 及 cefixime 第一線淋病用藥皆有敏感性降低情形
- ☐ 其他，請說明：\_\_\_\_\_

## 二、個案職業及身分別

- |                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 學生          | <input type="checkbox"/> 教保/托育人員            | <input type="checkbox"/> 現役軍人             | <input type="checkbox"/> 廚師              |
| <input type="checkbox"/> 餐飲從業人員      | <input type="checkbox"/> 飯店/旅館業之員工          | <input type="checkbox"/> 溫泉/SPA/泳池/三溫暖之員工 | <input type="checkbox"/> 農業              |
| <input type="checkbox"/> 漁業          | <input type="checkbox"/> 伐木業                | <input type="checkbox"/> 營造業              | <input type="checkbox"/> 畜牧業<br>(含牛、羊、豬) |
| <input type="checkbox"/> 屠宰業         | <input type="checkbox"/> 禽畜相關從業人員           | <input type="checkbox"/> 獸醫師              | <input type="checkbox"/> 實驗室工作人員         |
| <input type="checkbox"/> 看護人員        | <input type="checkbox"/> 養老院/養護中心之員工        | <input type="checkbox"/> 救護人員             | <input type="checkbox"/> 醫事人員            |
| <input type="checkbox"/> 醫護人員        | <input type="checkbox"/> 醫療廢棄物清潔人員          | <input type="checkbox"/> 性工作者             | <input type="checkbox"/> 水塔/水池清潔人員       |
| <input type="checkbox"/> 職業駕駛        | <input type="checkbox"/> 新住民之子女，父母國籍為：_____ |   | <input type="checkbox"/> 無業              |
| <input type="checkbox"/> 其他，說明：_____ |   |   |  |

## 三、個案性行為模式

- ☐ 從未發生性行為
- ☐ 同性間性行為
- ☐ 異性間性行為
- ☐ 雙性間性行為
- ☐ 不知道

## 四、個案曾發生性行為者保險套與藥物使用情形

(一) 與固定性伴侶性行為是否總是使用保險套：

- ☐ 是
- ☐ 否

☐無固定性伴侶

(二)與非固定性伴侶性行為是否總是使用保險套：

☐是

☐否

☐無非固定性伴侶

(三)是否每一次性行為都有使用保險套：

☐是

☐否

(四)無使用保險套原因(可複選)：

☐不適用(前提：每一次都有使用保險套)

☐手邊沒有保險套

☐覺得保險套太貴

☐性伴侶拒絕使用

☐使用起來不舒服

☐使用其他避孕方法

☐覺得沒有必要

☐沒有想到要用

☐其他原因，說明：\_\_\_\_\_

(五)性行為前是否曾使用助興、娛樂或成癮藥物？

☐有

☐無

☐不詳

(六)承上，性行為前曾使用的藥物(可複選)：

☐海洛因 ☐FM2 ☐古柯鹼、快克 ☐K 他命 ☐安非他命

☐大麻 ☐RUSH(肛門鬆弛劑) ☐搖頭丸、快樂丸、MDMA

☐不知道藥物種類 ☐其他，說明\_\_\_\_\_

## 五、個案其他血液或體液暴觸史

☐無

☐有，情形如下：

☐接受輸血或血液製品

☐接受洗腎

☐因意外遭針扎、器械傷害/傷口或黏膜曾接觸他人血液

☐共用針頭或稀釋液

☐其它，說明：\_\_\_\_\_

## 六、個案出國史

(一)感染前1個月內是否有出國史：

☐無

☐有，請說明國家：\_\_\_\_\_

(二)出國期間是否有發生不安全性行為？

☐有

☐無

## 七、個案感染症狀及後續治療情形

(一)是否有產生感染症狀？

☐是，症狀如下：

☐有尿道、陰道分泌物

☐解尿疼痛

☐其他致使就醫之情況，請說明：\_\_\_\_\_

☐否

(二)產生淋病症狀起始日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(三)開始治療的時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(四)治療的淋病用藥種類名稱、劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ ceftriaxone

☐ 500mg (IM, single dose)

☐ 1g (IM, single dose)

☐ 1g (IM, qd, 7days)

☐ 其他劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ cefixime

☐ 400mg (PO, single dose)

☐ 800mg (PO, single dose)

☐ 其他劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ gentamicin

☐ gentamicin 240mg (IM, single dose)

☐ 其他劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ doxycycline

☐ doxycycline 100mg (PO, bid, 7days)

☐ 其他劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ azithromycin

☐ azithromycin 1g (PO, single dose)

☐ azithromycin 2g (PO, single dose)

☐ 其他劑量及用法：\_\_\_\_\_

☐ erythromycin 0.5% 眼藥膏

☐ 其他：\_\_\_\_\_

(五)接受治療後是否還有感染症狀：

☐ 是，症狀如下：

☐ 有尿道、陰道分泌物

☐ 解尿疼痛

☐其他致使就醫之情況，請說明：\_\_\_\_\_

☐否

(六)是否同時有診斷出感染其他的性病

☐是，同時感染其他的性病，包括：\_\_\_\_\_

☐否

八、是否已完成治療：

☐是

☐否，原因：\_\_\_\_\_

☐不詳

九、性接觸者/伴侶資料(可新增十筆)：

(1) 性接觸者/伴侶姓名：\_\_\_\_\_

(2) 身分證字號/護照號碼：\_\_\_\_\_

(3) 與個案的關係：\_\_\_\_\_

(4) 性別：☐男 ☐女 ☐其他：\_\_\_\_\_

(5) 出生年月日：民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(6) 連絡電話/手機：\_\_\_\_\_

(7) 居住地址：\_\_\_\_\_

(8) 接觸期間起訖：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日~\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(9) 檢驗日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(10) 檢驗結果：☐陽性 ☐陰性

(11) 目前治療/就醫狀況(包含是否有感染症狀、是否接受治療)：\_\_\_\_\_

(12) 出國史(包括出國期間及國家)：\_\_\_\_\_

註：

1. MDR(多重抗藥性)：對於 penicillin 有抗藥性、ciprofloxacin 有抗藥性，及對第 3 代頭孢菌素(cefixime 或 ceftriaxone)有敏感性降低或對 azithromycin 有抗藥性。
2. XDR(廣泛抗藥性)：對於 penicillin 有抗藥性、ciprofloxacin 有抗藥性、對第 3 代頭孢菌素(cefixime 或 ceftriaxone)有敏感性降低及對 azithromycin 有抗藥性。
3. Ceftriaxone 敏感性降低 MIC  $\geq 0.125$  mg/L。
4. Cefixime 敏感性降低 MIC  $\geq 0.25$  mg/L。