



中心導管每日照護組合式措施 maintenance bundle


依據國外文獻及實證研究，包含下列5項措施：

1

每日評估是否拔除導管

(removing the line when no longer needed)：

每日檢視置放位置有無紅、腫、熱、痛等情形，由醫師評估需移除導管或繼續留置導管。



手部衛生(hand hygiene)：


照護前確實執行手部衛生。

2

3

更換無菌敷料(dressing change)：

每日檢視敷料有效日期，紗布至少每2天更換一次，無菌透明透氣敷料至少每7天更換一次，但若有潮濕、鬆散或變髒等情形，應立即更換。更換敷料前使用酒精性2% chlorhexidine或酒精性優碘進行病人皮膚消毒。



消毒注射帽(scrub the hub)：

執行經管路注入藥物或輸液等管路照護工作前，應使用含酒精消毒液徹底消毒。

4

5

更換延長管等輸液裝置(tubing and devices)：

對於未接受血液、血液製品或脂質輸液的給藥管路，至少每7天更換；接受血液、血液製品或脂質輸液的給藥管路，24小時內更換；接受propofol的給藥管路，12小時內更換。



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



<http://www.cdc.gov.tw>



1922防疫達人

www.facebook.com/TWCDC 疫情通報及關懷專線 1922