

潛伏結核感染(LTBI)治療 衛教說明範本

可就以下兩點考慮:

- (1)指標個案本身的傳播力 (公衛端把關)
- (2)接觸者的易感受性來考慮(醫師端協助)

如何向個案解釋?

• 請不要說:

- 因為你是結核病的接觸者,所以你必須要治療......

而要說:

你曾經暴露過結核菌,而且受到感染,但是請不要擔心,因為.....

好消息與壞消息

有一個好消息:

- 你並沒有生病,而且也不會傳染給其他人。

有一個壞消息:

但是,現在這隻菌躲在你的體內睡覺,如果你現在沒 有接受治療,有一天它會再活化,你就會開始生病, 而且還有可能會傳染給其他人。

需要治療的理由

• 為什麼需要治療?

治療是為了避免將來有一天你會生病,也是保護你和你的家人。

要記得提醒:

因為結核菌是一種很難纏的細菌,所以你一定要好好的服藥,完成治療療程,才有辦法將你體內躲藏的結核菌殺死。

副作用解釋

- 就像其他藥物一樣,有可能還是會有一些副作用產生。
- 要如何避免副作用產生?
 - 請加入都治計畫,除了有關懷員送藥,同時也可以協助觀察 是否有副作用的問題
 - 請固定每月回診
 - 請避免飲酒
 - 請不要服用過量的退燒止痛藥或來路不明的中藥/健康食品, 避免增加身體負擔
 - 如果你有出現不舒服情形,請記得跟公衛護士或關懷員反應,並且馬上回診
 - 請注意是否合併抗癲癇藥物使用
- 在病人離開診間前
 - 請再確認病人了解藥物可能的副作用,而且知道要如何觀察 與處理

對每一位轉介來的接觸者要......

- 如果接觸者已知指標個案,則先評估結核病感染的風險(暴露史與指標個案傳染力)。
- 若接觸者不知道指標個案,為保護指標的隱私,則醫療端 無從評估暴露史,就只要進行指標個案傳染力之評估。
- 請務必先排除接觸者發病的狀況。
- 潛伏結核感染檢驗(TST或IGRA) 陽性的接觸者,在排除結核 病後,請評估是否適合接受LTBI治療,並開始治療。
- 一旦開始治療,請每月定期回診,以監測副作用並追蹤服藥順從性。

潛伏結核全都治 專區

www.cdc.gov.tw/主題專區/ 潛伏結核全都治專區





::: 首頁 | 民眾版 | 兒童版 | English | 署長信箱 | 網站導覽 熱門搜尋: 茲卡病毒,流風,登革熱,腸病毒

傳染病介绍 | 衛教與教材 | 通報與檢驗 | 國際旅遊與健康 | 預防接種 | 統計資料 | 防疫夥伴 | 出版品類 | 學術研究

▲首百>傳染病介紹>第三類法定傳染病>結核病>治療 照護 > 潛伏結核全都治 > 潛伏結核全都治_相關附件





潛伏結核全都治

潛伏結核全都治_相關附件(2017-02-08) [3] [3]

- (1)105年潛伏結核感染治療政策說明:(公衛版)、(醫師版)
- (2)105年速克伏短程治療處方介紹:(pdf)、(影音版)
- (3)105年「潛伏結核全都治計畫」Q&A:(民眾版)、(公衛版)、(醫院版)
- (4) 速克伏處方使用臨床建議
- (5) 速克伏處方藥品使用同意書:(中文版),(英文版)
- (6) 速克伏短程治療處方用藥須知
- (7)醫師小卡片
- (8)潛伏結核 咸染治療合作醫師門診時間表(odt)
- (9)潛伏結核全都治相關官導短片
- (10)醫療及檢驗自動介接補助計畫
- (11)第一次速克伏使用經驗交流會議問答集
- (12)免疫風濕病患者進行潛伏結核咸染治療速克伏合作醫院(13家)

