

Surat Pemberitahuan kepada Orang Tua Tentang Imunisasi BCG

Tujuan Imunisasi

Imunisasi BCG bisa mencegah anak kecil mengalami penyakit TBC yang parah. Menurut penelitian, anak kecil yang belum imunisasi BCG, peluang terjadi meningitis TBC radang otak adalah 152,5 per juta, adalah 47 kali lipat lebih banyak dibanding yang telah imunisasi. Penyakit jenis ini bila tidak segera diobati, akan menyebabkan cerebrosipinal dan lesi yang tidak dapat diubah (tidak dapat mengurus kehidupan sendiri, kecerdasan terganggu), dan diiringi dengan peluang kematian sekitar 20%~40%.

Kapan Sebaiknya Imunisasi

Bagi bayi yang tidak ada kontradiksi imunisasi, sebaiknya imunisasi setelah genap 5-8 bulan sejak lahir, paling lambat sebelum berusia 1 tahun. Bila setelah usia 1 tahun baru imunisasi, maka sebelum imunisasi, harus melakukan penilaian penularan TBC yang latensi (Pemeriksaan injeksi intradermal jenis lainnya), maka akan lebih memakan waktu dan tenaga, oleh karena itu silahkan mengikuti jadwal untuk imunisasi.

Reaksi tidak baik Setelah Imunisasi

- Reaksi tidak baik yang sering terlihat namun tidak parah: nanah pada sebagian tempat, limfadenitis.
- Reaksi tidak baik yang tidak sering terlihat namun lebih parah: Osteitis / osteomyelitis.

Negara Taiwan sejak tahun 2007 mulai secara aktif memantau efek tidak baik pada imunisasi BCG. Menurut data, peluang terjadi Osteitis / osteomyelitis sekitar 55 per juta, masih dalam rentang yang diperkirakan WHO.

Sumber Data	Efek Samping	Osteitis / osteomyelitis	Penularan BCG yang disebarluaskan
Data pantauan negara Taiwan (Zaman kelahiran Tahun 2008-2009)		55 kasus/ jutaan orang	0 kasus/ jutaan orang
Laporan WHO Tahun 2000		2-700 kasus/ jutaan orang	2 kasus/ jutaan orang

Hal yang perlu diperhatikan sebelum usia 5 tahun

Anak kecil bisa terjadi nanah pada sebagian tempat / bengkak yang acurigai efek tidak baik imunisasi BCG, boleh mengingatkan dokter untuk mempertimbangkan faktor imunisasi ke dalam penilaian; atau Dinas (Klinik) Kesehatan membantu rujukan rumah sakit pengobatan pediatric (atau meminta dokter pediatric untuk ikut dalam konsultasi), untuk selanjutnya memastikan faktor penyakit lebih lanjut. Penderita yang diduga/pasti sakit karena imunisasi, boleh melalui penjelasan dan bantuan oleh Dinas Kesehatan di lokal, memohon bantuan atas penderitaan karena imunisasi.

Sebelum Imunisasi

- Silahkan pastikan keluarga kedua pihak ayah dan ibu tidak ada sejarah keluarga yang diduga HIV (misalnya karena alasan tidak jelas, dan terinfeksi hingga meninggal). Selain itu, balita yang dilahirkan oleh ibu yang tertular HIV, setelah konsultasi dengan dokter spesialis infeksi, baru boleh imunisasi.

Sewaktu Imunisasi

- Motilitas bayi yang genap berusia 5-8 bulan sangat baik. oleh karena itu perlu menetapkan posisi bayi dengan baik, untuk mempermudah injeksi intradermal BCG. Orang tua diminta berkoordinasi dengan petunjuk petugas profesional, agar proses injeksi berhasil diselesaikan.

Setelah Imunisasi

- Orang tua seharusnya secara berkala menggunting kuku bayi. Setelah imunisasi, gunakan kain kasa menutupi bagian imunisasi dan menggunakan plester untuk menetapkan tempat, atau mengenakan pakaian berlengan, untuk mencegah anak kecil menggaruk bagian imunisasi hingga luka, menyebabkan infeksi yang tidak perlu.

Kondisi normal setelah imunisasi

1-2 minggu

Bagian injeksi akan muncul satu benjolan, setelah itu akan menjadi besar, sedikit gatal dan sakit, namun tidak demam.



4-6 minggu

Akan muncul abses atau ulkus, tidak perlu mengoles obat atau dibungkus, asalkan menjaga tetap bersih dan kering, bila ada nanah yang mengalir keluar, boleh menggunakan kasa yang steril atau kapas untuk melap, hindari tekanan.



2-3 bulan

Akan sembuh dan muncul krusta secara bersamaan, meninggalkan bekas luka, setelah melalui suatu waktu akan berubah menjadi warna kulit.



Info Lain

Bila Anda perlu informasi yang berkaitan tentang imunisasi BCG, silahkan ke perkenalan penyakit menular/pencarian topik utama TBC di situs Departemen Kesejahteraan dan Kesehatan Dinas Pengendalian Penyakit : <http://www.cdc.gov.tw>.

Resi Surat Pemberitahuan kepada Orang Tua:

Telah membaca "Surat Pemberitahuan Imunisasi BCG" dan telah menerima panduan kesehatan oleh petugas yang memberikan imunisasi

Nama anak : _____ (atau anak pria/wanita dari ooo)

Tanda tangan atau stempel orang tua: _____

Tanda tangan atau stempel oleh yang melakukan imunisasi: _____



Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan
Dinas Pengendalian Penyakit Peduli terhadap Anda