

## 破傷風、減量白喉 (Td) 混合疫苗使用 Q&A

### Q1、現行使用之 Td 疫苗廠牌、包裝樣式為何？

A：美國 MassBiologics 產製之 Tetanus and Diphtheria Toxoids Adsorbed 供應，其包裝方式為 0.5 ml/Vial/單劑(10 劑/盒)，由疾病管制署專案進口。

### Q2、Td 疫苗適用哪些接種對象？

A：(1) 公費疫苗：國小一年級至六年級學童補種。  
(2) 自費市場：國小一年級以上兒童、青少年及成人之追加接種。

### Q3、Td 疫苗接種途徑為何？接種後可能發生的不良反應有哪些？

A：採肌肉注射。接種後可能發生接種部位紅腫、疼痛，偶有食慾不振、疲倦或發燒等症狀。民眾如發現接種後的紅腫持續擴大，或有持續高燒及嚴重不適等症狀，請儘速就醫，釐清病因。

### Q4、Td 疫苗接種的禁忌及注意事項有哪些？

A：

接種禁忌	注意事項
<p>* 先前接種含白喉破傷風相關疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。</p>	<p>* 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜於醫師判斷病情已經穩定後才注射疫苗。</p> <p>* 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。</p> <p>* 先前接種含破傷風類毒素疫苗後 6 週內曾發生過 GBS 者。</p> <p>* 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生 Arthus 過敏反應者，與次劑含破傷風類毒素疫苗應間隔 10 年以上再接種。</p>

備註：Arthus 過敏反應為局部連續注射抗原所引起組織的發炎反應。