

កំណត់សម្គាល់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់សិស្សបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបន្ថែមចាក់វ៉ាក់សាំងការរំពឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ឪពុកម្តាយ ជូនដោយសាលា\_\_\_\_\_

ខេត្ត(ក្រុង)\_\_\_\_\_

កូនរបស់លោកអ្នកឈ្មោះ:\_\_\_\_\_ក្នុងថ្នាក់\_\_\_\_ ឆ្នាំ\_\_\_\_\_ អត្តលេខ\_\_\_\_\_ នៅថ្ងៃទី\_\_\_\_ ខែ\_\_\_\_ ឆ្នាំ\_\_\_\_\_

បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយរួចហើយ

មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយទេ(មូលហេតុដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង:

\_\_\_\_\_ ហើយសូមយកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមកមណ្ឌលសុខភាព/មណ្ឌលពេទ្យ\_\_\_\_\_ ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងមុនថ្ងៃទី \_\_\_\_\_ ខែ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ២០២៣(មុននឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំង

ស្នើលោកអ្នកទាក់ទងជាមួយមន្ទីរពេទ្យជាប់កិច្ចសន្យាបានកំណត់ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា នៅមានវ៉ាក់សាំងឬទេ ទើបទៅចាក់វ៉ាក់សាំង)។

ហត្ថលេខានិងត្រារបស់គ្រូពេទ្យ: \_\_\_\_\_

ចំណាំ: កាលណាលោកអ្នកយកលិខិតនេះទៅមន្ទីរពេទ្យជាប់កិច្ចសន្យាបានកំណត់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំង លោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃព្យាបាលដែលពាក់ព័ន្ធដោយខ្លួនឯង ស្របតាមកំណត់របស់មន្ទីរពេទ្យ។

**【កំណត់សម្គាល់ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង】**

មួយ.វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយគឺជាវ៉ាក់សាំងអសកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពខ្លាំង បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង នៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងមានលទ្ធភាពអាចមានការឈឺចាប់ ក្រហមនិងហើម មានមនុស្សតិចតួចនឹងមានប្រតិកម្មស្រាលក្នុងទូទាំងខ្លួន ដូចជា គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ ចង្កោរ រមាស់ស្បែក កញ្ជ្រើលឬកន្ទួលក្រហមជាដើម ប៉ុន្តែតាមធម្មតានឹងជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលមួយទៅពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺកម្រមានណាស់។

ពីរ.មានមនុស្សចំនួនប្រហែល1-2%អាចមានប្រតិកម្មក្តៅខ្លួនក្នុងរយៈពេល48

ម៉ោងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ត្រូវតែប្រាប់ដល់គ្រូពេទ្យថា  
ខ្លួនធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយពីមុន

ដើម្បីធ្វើជាឯកសារយោងសម្រាប់គ្រូពេទ្យ វិនិច្ឆ័យរោគ។

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង48ម៉ោងនៅតែបន្តក្តៅខ្លួន

គួរតែពិចារណាថា មានការឆ្លងផ្សេងទៀត ឬមូលហេតុនៃគ្រុនក្តៅ។

បី.បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើមានគ្រុនក្តៅជាប់លាប់

ស្មារតីឬអាកប្បកិរិយាមានការប្រែប្រួល ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់  
និងរោគសញ្ញាមិនស្រួលផ្សេងទៀត

គួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលឱ្យបានឆាប់តាមលទ្ធភាព

ហើយជូនដំណឹងទៅគ្រូ/បុគ្គលិកគិលានុបដ្ឋាយិការបស់សាលារៀន

ឬហៅលេខទូរសព្ទប្រឹក្សាដូចខាងក្រោម

នឹងមានបុគ្គលិកពិសេសផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់លោកអ្នក។

បួន. ការដួលសន្លប់ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង តាមធម្មតាបណ្តាលមកពីសម្ពាធផ្លូវចិត្ត

និងក្តីភ័យខ្លាចចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង

ដែលប្រែក្លាយទៅជារោគសញ្ញារាងកាយ ដូចជាវិលមុខនិងចង្កោរជាដើម

ភាគច្រើនកើតឡើងនៅពេលក្មេងជំទង់មួយក្រុមទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង។

ក្នុងអំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំ

ជួនកាលនឹងកើតឡើងការដួលសន្លប់ជាក្រុម

មេះត្រូវបានគេហៅថាជាជំងឺផ្លូវចិត្តជាសមូហភាព។ ប្រតិកម្ម

ដួលសន្លប់ដោយសារចាក់វ៉ាក់សាំងគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង

នោះទេ ហើយមិនដែលបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសោះ។ បន្ទាប់ពីត្រឡប់

មកផ្ទះវិញ ប្រសិនបើសិស្សបន្តដួលសន្លប់ គួរតែបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យ ដើម្បី

វិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាល។

ប្រាំ.ទោះបីជាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ

ក៏ដោយ

ក៏នៅតែមានលទ្ធភាពឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមដែលបណ្តាលមកពីមេរោគដែលមិនមែនជាជំងឺគ្រុនផ្តាសាយផ្សេងទៀត ដូច្នោះ សូមយកចិត្តទុកដាក់លើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន និងចាត់វិធានការបង្ការផ្សេងៗដើម្បីរក្សាសុខភាពខ្លួន។

ប្រាំមួយ.ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងប្លាកែត

ឬថ្នាំប្រឆាំងនឹងកំណកនហឈាម ឬមានមុខងារកកឈាមខុសប្រក្រតី ត្រូវដាក់សំពាធនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់២នាទីបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយសង្កេតមើលថាតើនៅតែមានករណីហូរឈាម ឬជុំពកបង្កដោយឈាមឬទេ។

ប្រាំពីរ.ប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នកជាសិស្សទាបជាងថ្នាក់ទី២ក្នុងបឋមសិក្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្តាសាយជាលើកដំបូងតាំងពីកំណើត បើសិនលោកអ្នកយល់ឃើញថាត្រូវការបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងយ៉ាងហោចណាស់៤អាទិត្យ លោកអ្នកអាចទៅមន្ទីរពេទ្យទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី 2 ដោយបង់ថ្លៃផ្ទាល់ខ្លួន។

មន្ទីរសុខភាព\_\_\_\_\_សូមគោរពជូន

មន្ទីរសុខភាព\_\_\_\_\_លេខទូរស័ព្ទពិគ្រោះពិសេស\_\_\_\_\_

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺ លេខទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់រាយការណ៍និងពិគ្រោះជំងឺ ៖ 1922

សាលារៀន\_\_\_\_\_លេខទូរស័ព្ទពិគ្រោះពិសេស\_\_\_\_\_