TB及LTBI 常見治療藥品簡介

- TB 單方劑型藥品
- TB 複方劑型藥品
- LTBI – 3HP 單方
- LTBI – 3HP 複方

想了解更多藥物資訊>> 請見本署公告「結核病診治指引」第六章 (TB)、第十章 (LTBI)

衛生福利部疾病管制署
Taiwan Centers for Disease Control

(https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/YpPM4PxFx3b_6FKuMDYjew)

TB - 單方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	常見副作用	使用須知
Isoniazid (INH) 100mg	 異菸醯錠(強生)	白色 圓扁形 藥錠	• 皮疹及其他過敏性反應 • 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振) • 周邊神經病變 (對稱性之端麻木或刺痛感)	• 對INH抗藥，或有INH藥物過敏史者不可使用 • 宜避免與食物併用，或服用後2小時才服用抗酸劑
Rifampin (RMP) 300mg*	 “榮民” 利肺寧膠囊 300mg	暗紅橙/深黃橙色，長圓柱形膠囊	• 尿液、眼淚、痰液呈橘紅色 (RMP 代謝正常現象) • 皮疹 • 類流感症狀 • (少數) 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振)	• 對RMP抗藥，或有RMP/rifamycin類藥物過敏史者不可使用 • 宜避免與食物併用 • RMP會降低口服避孕藥的效果，應改採其他避孕方式

*其他藥廠製RMP

"永信"立汎黴素膠囊300mg
(暗紅色，長圓柱形膠囊)

瑞比新膠囊 (立汎黴素)
300mg
(紅色，長圓柱形膠囊)

"羅得"立化黴素膠囊300mg
(暗紅色，長圓柱形膠囊)

"國嘉"立泛黴素膠囊300mg
(咖啡色，長圓柱形膠囊)

TB - 單方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	常見副作用	使用須知
Pyrazinamide (PZA)	 "培力"匹井梭安錠500mg	白色圓扁形藥錠，單面有P字樣	• 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振) • (少數) 皮疹、胃腸不適、尿酸值上升、痛風發作(關節痠痛)、 血糖升高	• 對PZA抗藥，或有PZA藥物過敏史者不可使用
Ethambutol (EMB)	 "培力"力肺妥膜衣錠400mg	深藍色/深紅色，長圓柱形膠囊，兩端皆有Peili C03字樣	• 視神經病變 (視力模糊、視野缺損、色彩辨識異常) • 過敏性反應 (皮膚癢或發炎、關節痛、食慾不振、腸胃不適等)	• 對EMB抗藥，或有EMB藥物過敏史者不可使用 • 不宜與抗酸劑併用 • 藥品磨碎後易受潮，應小心保管
	 "優生"易復癆錠（醫肺妥）(EMB)	白色 圓扁形藥錠，單面有 YS-<>-EB字樣		

TB - 單方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	常見副作用	使用須知
Rifabutin (RFB)	 "輝瑞"淨核膠囊150mg	紅棕色，長圓柱形膠囊，兩端字樣為MYCOBUTIN Pharmacia & Upjohn	• 尿液、眼淚、痰液呈橘紅色 (RFB代謝正常現象) • 皮疹 • 腸胃不適 • 關節痠痛 • 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振) • 單側或雙側眼葡萄膜炎	• 對RFB抗藥，或有RFB/rifamycin類藥物過敏史者不可使用 • 高脂肪食物可能會降低RFB 腸道吸收

(下面還有藥物資訊，謝謝你們認真閱讀！)

TB - 複方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	成分及注意須知
Rifinah (RFN) 150mg	(圖片來源：奇美醫院衛教資訊網） 樂肺寧糖衣錠150mg	粉紅色， 圓凸形糖衣錠	• RFN (150mg) 為 **INH (100 mg)** 及 **RMP (150 mg)** 二合一劑型 • 常見副作用故常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 所提事項
Rifinah (RFN) 300 mg	 (圖片來源：奇美醫院衛教資訊網） 樂肺寧糖衣錠 300mg	肉橙色，長條形糖衣錠	• RFN (300mg) 為 **INH (100 mg)** 及 **RMP (300 mg)** 二合一劑型 • 常見副作用故常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 所提事項
RINA	 “培力” 利肺膠囊	深紅色/深藍色， 長圓柱形膠囊， 兩端有Peili C03字樣	• RINA為 **INH (150 mg)** 及 **RMP (300 mg)** 二合一劑型 • 常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 所提事項

TB - 複方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	成分及注意須知
Macox Plus	 祛核-二合膜衣錠 300	暗紅色，圓扁形藥錠，單面有剝痕	• Macox Plus 為 INH (150 mg) 及 RMP (300 mg) 二合一劑型 • 常見副作用故常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 所提事項
AKuriT-3 (AKT-3)	 立剋核膜衣錠	紅棕色，長橢圓形膜衣錠	• AKuriT-3 為 INH (75 mg) 、RMP (150 mg) 及 EMB (275mg) 三合一劑型 • **常見副作用及使用須知請見前面** 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 及 **EMB** 所提事項
Trac 3 Tablets	 祛核-三合膜衣錠	暗紅色，圓形膜衣錠	• Trac 3 為 INH (75 mg)、RMP (150 mg)、及 EMB (275mg) 三合一劑型 • 常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 **INH**、**RMP** 及 **EMB** 所提事項
Rifater (RFT)	 賽諾菲-衛肺特糖衣錠	粉橙色，圓凸形糖衣錠	• RFT為 INH (80 mg)、RMP (120 mg) 及 PZA (250 mg) 三合一劑型 • 常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中**IMH**、**RMP**、**PZA** 所提事項

TB - 複方劑型藥品

藥品	圖示/中文品名	外觀描述	成分及注意須知
AKuriT-4 (AKT-4)	 (圖片來源：賣建醫院藥劑科) 立剋核-4膜衣錠	暗紅色，橢圓形膜衣錠，單面有剝痕	• AKT-4 為 INH (75 mg) 、RMP (150 mg) 、PZA (400 mg) 及 EMB (275mg) 四合一劑型 • 常見副作用故常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中INH、RMP、PZA、EMB 所提事項
Trac 4 Tablets	 祛核-四合膜衣錠	肉色， 橢圓形膜衣錠	• Trac 4 為 INH (75 mg) 、RMP (150 mg) 、PZA (400 mg) 及 EMB (275mg) 四合一劑型 • 常見副作用及使用須知請見前面 單方藥品 中 INH、RMP、PZA 及 EMB 所提事項

LTBI - 3HP 單方

成分	圖示/藥品名稱	外觀描述	常見副作用	使用須知
Isoniazid (INH) 300mg		白色，圓凸形藥錠	• 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振) • 周邊神經病變 (對稱性之端麻木或刺痛感) • (少數) 皮疹及其他過敏性反應	• 對INH抗藥，或有INH藥物過敏史者不可使用 • 宜避免與食物併用，或服用後2小時才服用抗酸劑 • 為專案進口藥品，須簽立同意書
Rifapentine (RPT) 150mg	Priftin 肺挺膜衣錠	粉橙色，圓凸形膜衣錠，單面有F字樣	• 尿液、眼淚、痰液呈橘紅色 (RPT代謝正常現象) • 皮疹 • 類流感症狀 • (少數) 肝毒性 (皮膚、眼白變黃或食慾不振)	• 對RPT抗藥，或有RPT、rifamycin 藥物過敏史者不可使用 • 不宜與抗酸劑併用

LTBI - 3HP 複方

圖示/藥品名稱	外觀描述	成分、副作用及使用須知
HP複方膜衣錠	橘色，長橢圓形膜衣錠，單面有剝痕及 J 21 字樣	• HP複方為 <u>INH (300 mg)</u> 及 <u>RPT(300 mg)</u> 二合一劑型 • 常見副作用及使用須知請見上面 **INH**、**RPT** 所提事項 • 為專案進口藥品，須簽立同意書