

ต้องทิ้งและห้ามใช้โดยเด็ดขาด

5. กำจัดพาหะนำโรค และกั้นแมลงวันเปิดฝาดังขยะเสมอและทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำ
6. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งอาเจียนของผู้ป่วยนั้น  
ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อ อโรทากน้ำ ลาย

หากสงสัยว่าติดเชื้อ อโรทากและลำไส้อักเสบจากไวรัส ควรทำอย่างไร

หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง กระเพาะอาหารบีบตัวรุนแรง ตัวร้อน และอาการอื่นๆที่คล้ายกับโรคนี้ ควรรีบพบแพทย์และพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 48 ชั่วโมงซึ่งอาการป่วยจะทุเลาลงแล้วถึงจะฟื้นฟูไปเรียนหรือไปทำงาน หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ควรสวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจเรื่องล้างมืออย่างถูกต้องและอย่างถูกหลักวิธี หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสปากและจมูก เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ ออกจากการพบปะผู้อื่น สำหรับข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องสามารถรับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค [www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw) หรือโทรสอบถามข้อมูลที่สายด่วน 1922 หรือ 0800-001922