

Giấy thông báo phụ huynh về tiêm chủng ngừa lao

Mục đích tiêm chủng

Tiêm chủng vắc xin ngừa lao có thể tránh cho trẻ em mắc bệnh lao nặng, theo nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bị lao màng não của trẻ em không tiêm vắc-xin ngừa lao đạt khoảng 152,5/1 triệu, cao gấp 47 lần so với trẻ có tiêm vắc-xin ngừa lao, căn bệnh này nếu không điều trị sớm sẽ gây ra các tai biến không thể phục hồi như bệnh về dịch não tủy (không thể tự lo liệu cuộc sống cho bản thân được, gây ảnh hưởng tới trí óc), đồng thời cũng kèm theo tỷ lệ gây tử vong đạt khoảng 20%~40%.

Thời điểm tiêm chủng thích hợp

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu không có những triệu chứng dẫn đến phải kiêng không được tiêm chủng, nên tiêm chủng trong khoảng thời gian tròn 5-8 tháng, chậm nhất phải hoàn thành trước 1 tuổi. Nếu sau 1 tuổi mới tiêm chủng vắc xin ngừa lao, trước khi tiêm chủng phải tiến hành đánh giá khả năng nhiễm lao tiềm ẩn (kiểm tra bằng phương pháp tiêm vào dưới da theo cách khác), sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn, do vậy khuyến cáo nên tiến hành tiêm chủng theo đúng thời gian biểu được khuyến cáo.

Những phản ứng không tốt có thể xảy ra sau khi tiêm chủng

- Những phản ứng không tốt thường gặp nhưng không nghiêm trọng: bị áp xe cục bộ, viêm hạch.
 - Những phản ứng không tốt không hay gặp nhưng nghiêm trọng: viêm xương/viêm tủy xương.
- Từ năm 2007 trở đi Đài Loan bắt đầu chủ động theo dõi giám sát những phản ứng không tốt của vắc-xin ngừa lao, theo dữ liệu cho thấy tỷ lệ xảy ra viêm xương, viêm tủy xương đạt khoảng 55/1 triệu, vẫn thuộc phạm vi theo dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nguồn dữ liệu	Tác dụng phụ	Viêm xương/ viêm tủy xương	Nhiễm BCG lan tỏa
Dữ liệu giám sát của Đài Loan (Trẻ ra đời trong khoảng năm 2008-2009)		55 ca/ 1 triệu người	0 ca/ 1 triệu người
Báo cáo năm 2000 của Tổ chức Y tế thế giới		2-700 ca/ 1 triệu người	2 ca/ 1 triệu người

Những điều cần chú ý trước lúc trẻ 5 tuổi

Trẻ nếu xuất hiện các phản ứng không tốt bị nghi ngờ là do tiêm vắc-xin ngừa lao như vết áp-xe/ sưng tấy cục bộ, nên nhắc bác sĩ đưa các yếu tố về tiêm chủng vắc-xin ngừa lao vào nội dung đánh giá; hoặc liên hệ với Sở (Trạm) Y tế địa phương hỗ trợ giới thiệu chuyển tới khoa Nhi của bệnh viện để điều trị (hoặc đề nghị bác sĩ chuyên khoa Nhi tiến hành hội chẩn), để có thể làm rõ hơn nguyên nhân gây bệnh. Người bị nghi/đã được xác nhận bị tổn thương do tiêm chủng vắc-xin ngừa lao, có thể thông qua sự giải thích và hỗ trợ của Sở Y tế tại nơi tiêm chủng, để xin cấp trợ cấp cứu trợ phòng ngừa thiệt hại do tiêm chủng.

Trước khi
tiêm chủng

Trong lúc
tiêm chủng

Sau khi
tiêm chủng

- Trước hết hãy xác nhận hai bên gia đình của cha mẹ không có tiền sử gia đình bị nghi ngờ mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh (như trẻ em tử vong do nhiễm trùng không rõ nguyên nhân). Ngoài ra đối với trẻ sơ sinh được sinh bởi người mẹ bị nhiễm Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV), sau khi xin ý kiến được bác sĩ chuyên khoa đồng ý, mới được tiêm chủng.

- Trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian tròn 5-8 tháng có sức hoạt động tốt, do vậy phải giữ chặt trẻ sơ sinh, để tiến hành tiêm vắc-xin ngừa lao được thuận lợi, đề nghị phụ huynh phối hợp theo sự chỉ dẫn chuyên môn của nhân viên y tế, để hoàn thành thuận lợi quá trình tiêm chủng.

- Đề nghị phụ huynh thường xuyên cắt móng tay móng chân cho trẻ sơ sinh, sau khi tiêm chủng, dùng miếng gạc khô đắp lên chỗ tiêm và dán băng dính cố định lại, hoặc mặc áo có tay, tránh trẻ gãi làm bị thương chỗ tiêm, gây nhiễm trùng không cần thiết.

Trạng thái bình thường sau khi tiêm chủng

1-2 tuần

Chỗ vết tiêm sẽ nổi lên một cục tròn nhỏ màu đỏ, sau đó sẽ to dần lên, hơi ngứa và đau nhưng không sốt.



4-6 tuần

Sẽ chuyển thành vết loét hoặc có mủ, không cần bôi thuốc hoặc băng bó, chỉ cần giữ cho khô ráo sạch sẽ, nếu bị chảy mủ có thể dùng miếng gạc hoặc bông gòn vô trùng lau sạch, không được nặn.



2-3 tháng

Sẽ đóng vảy và tự lành, để lại một vết sẹo nhỏ màu đỏ nhạt, sau một thời gian sẽ nhạt dần thành màu da.



Các thông tin khác

Nếu bạn cần thêm các thông tin liên quan về vắc-xin ngừa lao, mời bạn tra cứu trên trang chủ giới thiệu về bệnh truyền nhiễm/bệnh lao thuộc website thông tin toàn cầu của Cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan <http://www.cdc.gov.tw> .

Phiếu trả lời của phụ huynh được thông báo:

Tôi đã đọc kỹ “Giấy thông báo phụ huynh về tiêm chủng vắc-xin ngừa lao” và đã tiếp nhận sự hướng dẫn kiến thức y tế của nhân viên phụ trách tiêm.

Họ tên trẻ em: _____ (Hoặc con trai/ con gái của)

Phụ huynh ký tên: _____ Người phụ trách tiêm ký tên: _____



Cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan quan tâm bạn