

จะป้องกันโรคบิดอะมีบาอย่างไร?

ตอบ :

1. ผู้มีอาการหรือผลตรวจสอปเป็นบวกควรพบแพทย์รักษาโดยเร็ว และควรระวังล้างมือก่อนมืออาหารหรือหลังถ่ายอุจจาระเป็นพิเศษ
2. ระวังความสะอาดในส่วนของมือ ควรทานอาหารปรุงสุกและดื่มน้ำต้มสุก น้ำเสียจากครัวเรือนควรจัดการอย่างเหมาะสม
3. ป้องกันอาหารปนเปื้อน ใช้มุ้งในการแยกอาหารหรือปกเปิดอกผลไม้ หลีกเลี่ยงถูกพาหะนำโรค (เช่น : แมลงวัน แมลงสาบ) สัมผัส
4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสัมผัสกับทวารหนัก

แรงงานข้ามชาติป่วยเป็นโรคบิดอะมีบาสามารถรับการรักษาในไต้หวันได้

หรือไม่?

ตอบ :

1. แรงงานข้ามชาติผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์และเป็นโรคบิดอะมีบา ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอนามัยในการสอบสวนโรคระบาด รักษาโดยยาที่เสียค่าใช้จ่ายเองและทำการตรวจสอบซ้ำภายใน 1 เดือนหลังจากการรักษาเสร็จสิ้น(ตรวจ 3 ครั้ง ภายใน 7 วัน แต่ละครั้งห่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)ภายใน 65 วันหลังจากวันถัดไปที่ได้รับใบรับรองการตรวจสุขภาพ เมื่อการตรวจสอบ 3 ครั้งโดยสำนักงานควบคุมโรคระบาดผลออกมาล้วนเป็นลบ การตรวจสอบนั้นผ่านเกณฑ์
2. ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จะถือเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สำนักงานอนามัยในพื้นที่จะไม่ออกหนังสือตรวจรับรองให้ พร้อมสำเนาแจ้งกระทรวงแรงงาน (เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เพื่อดำเนินการลงหมายเหตุเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าไต้หวัน)

