

## 潛伏結核感染(LTBI)的1HP治療處方用藥須知

**使用 1HP 短程治療處方者請務必加入  
「都治計畫」，由關懷員關懷服下每個劑量！**

### 您已經被診斷出潛伏結核感染

您已經被檢驗出體內有結核菌但還沒有發病，目前不會傳染他人；但如果沒有接受治療，一旦自身免疫力降低時，就可能發病而且傳染給他人。

接受潛伏結核感染治療可以消滅您體內的結核菌，預防未來發病，是您最好的選擇。

### 什麼是 1HP 短程治療處方？


您每天服用 Rifapentine 和 Isoniazid 2 種藥品，共服藥 28天就可以完成治療的一種短程療法。

未滿13歲者、接觸具 isoniazid 或 rifampin 抗藥的接觸者或懷孕婦女，建議使用其他處方。

### 使用 1HP 短程治療處方要配合什麼？

因使用藥品是疾病管制署公費提供，所以必須接受衛生單位關懷員親自或視訊關懷服藥。您從醫院領藥回家後，先不要自行服用，請主動與開立接觸者檢查轉介單給您之衛生單位聯繫，衛生所關懷員會收回藥品並與您討論排定後續服藥時間。每次服藥時會觀察您是否有不舒服或服藥副作用，以確保您安全的完成治療。

若您有服用任何其他藥品(包括避孕藥)，應告訴您的醫師。1HP 處方可能會對某些藥品造成干擾，因此讓您的醫師知道您正在服用的藥品是很重要的。若您因其他疾病同時服用藥品，請務必告知該醫師，您正在接受潛伏結核感染治療。



保護您的家人及朋友免於感染  
結核病 您應完成潛伏結核感染  
治療療程！

## 服用 1HP 藥品注意事項

### 可能的副作用

部分服藥者可能會有下列不舒服，程度不會影響日常生活，多喝水多休息，服藥後數小時應可改善。但不舒服若持續超過 2 天，請與都治 關懷員連繫，讓衛生所護理師及醫師協助您。

- 頭暈、頭痛
- 發燒或畏寒
- 食慾不佳，或沒有食慾
- 皮膚或眼白變黃
- 胃不舒服、噁心或嘔吐
- 皮疹或搔癢
- 肌肉痠痛
- 臉紅及寒顫
- 無力、疲倦
- 手腳刺痛或麻木

### 飲酒

服用1HP 處方期間，每日飲酒會增加肝臟受損的風險，建議治療期間不要飲酒。

### 女性

1HP 處方會干擾荷爾蒙避孕法(包括避孕丸、避孕環及針劑)。治療期間建議使用保險套或子宮內避孕器等方式避孕。若您已經懷孕或疑似懷孕，請立刻通知您的醫師或公衛護理人員。

### 其他注意事項

rifapentine 可能會使您的尿液、唾液、眼淚或汗水變成橘紅色，這是正常現象，為了避免在治療期間被永久染色：請勿配戴非日拋隱形眼鏡、若您有配戴假牙，儘可能在不需要使用時把假牙取出。

### 過敏反應

雖然發生機會很低，但如果在療程中發現下列症狀：在每次服藥後都發生，如：呼吸喘、胸悶、冒冷汗、劇烈腹痛及嘔吐，且不適的時間逐漸縮短，或症狀持續時間逐漸延長，或覺得快要暈倒，您可能出現過敏反應，請立即向關懷員或衛生所護理師反映。

接觸者接受潛伏結核感染治療的保護力有90%以上，減少發病後須治療較長的時間、服藥總類及藥量。

若您出現急性過敏反應，請立即回到原就診醫院並與您的醫師聯絡；如果對於治療潛伏結核感染有任何疑問，亦請諮詢您的醫師或撥打 1922。

## 潛伏結核感染(LTBI)的3HP治療處方用藥須知

**使用 3HP 短程治療處方者請務必加入  
「都治計畫」，由關懷員關懷服下每個劑量！**

### 您已經被診斷出潛伏結核感染

您已經被檢驗出體內有結核菌但還沒有發病，目前不會傳染他人；但如果沒有接受治療，一旦自身免疫力降低時，就可能發病而且傳染給他人。

接受潛伏結核感染治療可以消滅您體內的結核菌，預防未來發病，是您最好的選擇。

### 什麼是 3HP 短程治療處方？


您每週服用一次 rifapentine 和 isoniazid 2 種藥品(包含 2 種單方藥品或1 種複方藥品)，共服藥 12 週就可以完成治療的一種短程療法。

未滿 2 歲的兒童、接觸具 isoniazid 或 rifampin 抗藥的接觸者或懷孕婦女，建議使用其他處方。

### 使用 3HP 短程治療處方要配合什麼？

所使用藥品是疾病管制署公費提供，所以必須接受衛生單位關懷員親自或視訊關懷服藥。您從醫院領藥回家後，先不要自行服用，請主動與開立接觸者檢查轉介單給您之衛生單位聯繫，衛生所關懷員會收回藥品並與您討論排定後續服藥時間。每次服藥時會觀察您是否有不舒服或服藥副作用，以確保您安全的完成治療。

若您有服用任何其他藥品(包括避孕藥)，應告訴您的醫師。3HP 處方可能會對某些藥品造成干擾，因此讓您的醫師知道您正在服用的藥品是很重要的。若您因其他疾病同時服用藥品，請務必告知該醫師，您正在接受潛伏結核感染治療。



保護您的家人及朋友免於感染  
結核病 您應完成潛伏結核感染  
治療療程！

## 服用 3HP 藥品注意事項

### 可能的副作用

部分服藥者可能會有下列不舒服，程度不會影響日常生活，多喝水多休息，服藥後數小時應可改善。但不舒服若持續超過 2 天，請與都治 關懷員連繫，讓衛生所護理師及醫師協助您。

- 頭暈、頭痛
- 發燒或畏寒
- 食慾不佳，或沒有食慾
- 皮膚或眼白變黃
- 胃不舒服、噁心或嘔吐
- 皮疹或搔癢
- 肌肉痠痛
- 臉紅及寒顫
- 無力、疲倦
- 手腳刺痛或麻木

### 飲酒

服用3HP 處方期間，每日飲酒會增加肝臟受損的風險，建議治療期間不要飲酒。

### 女性

3HP 處方會干擾荷爾蒙避孕法(包括避孕丸、避孕環及針劑)。治療期間建議使用保險套或子宮內避孕器等方式避孕。若您已經懷孕或疑似懷孕，請立刻通知您的醫師或公衛護理人員。

### 其他注意事項

- rifapentine 可能會使您的尿液、唾液、眼淚或汗水變成橘紅色，這是正常現象，為了避免在治療期間被永久染色：請勿配戴非日拋隱形眼鏡、若您有配戴假牙，儘可能在不需要使用時把假牙取出。
- 服藥後若有頭暈現象，換姿勢(如：平躺到坐起來，或由坐而起身)請採取「慢慢換、扶著換」，以避免因不適而導致跌倒。

### 過敏反應

雖然發生機會很低，但如果在療程中發現下列症狀：在每次服藥後都發生，如：呼吸喘、胸悶、冒冷汗、劇烈腹痛及嘔吐，且不適的時間逐漸縮短，或症狀持續時間逐漸延長，或覺得快要暈倒，您可能出現過敏反應，請立即向關懷員或衛生所護理師反映。

接觸者接受潛伏結核感染治療的保護力有90%以上，減少發病後須治療較長的時間、服藥總類及藥量。

若您出現急性過敏反應，請立即回到原就診醫院並與您的醫師聯絡；如果對於治療潛伏結核感染有任何疑問，亦請諮詢您的醫師或撥打 1922。