

兒童接種mRNA疫苗後應注意的心肌炎/心包膜炎

- **什麼是心肌炎/心包膜炎？**

心肌炎是指心臟肌肉發炎，心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎。這兩個情況可以單獨或同時發生(心肌心包膜炎)。

- **依據疫苗上市後安全性監測資料，接種mRNA疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。**

- 主要發生在接種後14天內(極少數個案發生於接種後2-4週間)
- 較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。
- 評估後mRNA疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

- **接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎/心包膜炎症狀，應立即就醫：**

- 胸痛、胸口壓迫感或不適症狀
- 心悸(心跳不規則、跳拍或顫動)
- 運動耐受不良(如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)
- 暈厥(昏厥)
- 呼吸急促

6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議

- 建議經醫師評估後6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡之風險
- 經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議**接種兩劑基礎劑**，**每劑須接種0.25ml (含25 μ g mRNA)**，兩劑間隔4-8週以上
- 接種部位，原則建議未滿2歲之嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌
- 感染COVID-19後短期內再次感染的風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗

6個月至5歲幼兒莫德納COVID-19疫苗接種後注意事項

- 接種後可透過接種單位提供的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，協助家長關注子女接種後狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率
- 接種後可能發生之常見副作用，如躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等，如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，**應儘速就醫釐清病因**