

Surat Pemberitahuan Peringatan Pasca-vaksinasi dan Vaksinasi Influenza Tambahan

Informasi vaksinasi untuk orang tua dari Sekolah \_\_\_\_\_, Kota/Kabupaten \_\_\_\_\_

Yth. Orang tua/Wali,

Putra/putri Anda \_\_\_\_\_, Kelas: \_\_\_\_\_; Nama Kelas: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_,

**Sudah menerima** vaksin influenza pada: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Belum menerima** vaksin influenza

(Alasan: \_\_\_\_\_);

mohon membawa surat ini ke Rumah Sakit/Klinik \_\_\_\_\_ sebelum \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ untuk menerima vaksinasi)

(Sebelum berangkat melakukan vaksinasi, harap hubungi rumah sakit/klinik yang ditunjuk untuk mengonfirmasi ketersediaan vaksin.)

Tanda tangan dokter: \_\_\_\_\_

Catatan: Jika Anda membawa surat ini ke rumah sakit/klinik yang ditunjuk untuk mendapatkan vaksinasi, Anda harus membayar biaya sesuai ketentuan rumah sakit/klinik.

Informasi Peringatan Pasca-vaksinasi

1. Vaksin influenza adalah vaksin inaktif yang mengandung virus yang sudah mati. Efek samping yang mungkin muncul adalah rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar area vaksin, dan beberapa orang mungkin mengalami demam, sakit kepala, atau mual. Efek samping ini hanya berlangsung 1 hingga 2 hari setelah vaksinasi. Efek samping serius sangat jarang terjadi.
2. Anak Anda mungkin mengalami demam dalam 48 jam setelah vaksinasi. Beri tahu dokter bahwa anak Anda baru divaksinasi sebagai referensi untuk diagnosis. Apabila demam masih berlanjut lebih dari 48 jam setelah vaksinasi, Anda harus mempertimbangkan kemungkinan infeksi atau penyebab demam lain dan mencari pertolongan medis.
3. Jika anak Anda mengalami demam terus-menerus atau reaksi alergi parah di mana anak mungkin mengalami kesulitan bernapas, asma, pusing, detak jantung cepat, dan gejala-gejala lainnya setelah vaksinasi, Anda harus segera mencari pertolongan medis dan memberi tahu guru wali kelas, atau menghubungi nomor hotline yang tertera di bawah.
4. Pingsan biasanya disebabkan oleh rasa sakit atau kecemasan. Terkadang orang pingsan setelah vaksinasi, terutama remaja. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pingsan disebabkan oleh proses vaksinasi dan bukan karena vaksinnya sendiri. Pingsan bukan hal yang serius, tetapi bahaya akibat terjatuh atau kecelakaan lain bisa menyebabkan luka. Jika pingsan atau pusing masih berlanjut setelah vaksinasi, segera carilah pertolongan medis.

5. Vaksin hanya melindungi anak Anda dari infeksi influenza. Anak Anda masih bisa terjangkit infeksi saluran pernapasan lain atau flu biasa. Bantu anak Anda menjaga kebersihan dan melakukan tindakan pencegahan lain untuk menjaga kesehatannya.
6. Jika anak Anda mengonsumsi obat antiplatelet atau antikoagulan atau menderita gangguan pembekuan darah, luka suntik harus dikompres selama setidaknya 2 menit setelah vaksinasi, dan dicek apakah terjadi perdarahan atau hematoma.
7. Pada program imunisasi influenza sekolah, setiap siswa mendapat satu dosis vaksin di sekolah. Jika anak Anda berusia kurang dari 8 tahun dan belum pernah mendapat vaksin flu musiman apa pun sebelumnya, dosis tambahan bisa diberikan setidaknya 4 minggu setelah vaksinasi pertama.

\_\_\_\_\_ Biro Kesehatan Masyarakat

-----  
\_\_\_\_\_ Hotline Konsultasi Sekolah: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Hotline Konsultasi Biro Kesehatan Masyarakat: \_\_\_\_\_

Hotline Pelaporan dan Informasi Epidemi, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan: 1922