

其中以肝膿瘍 (liver abscess) 最為普遍，更甚者為肺膿瘍或腦膿瘍等。
Hầu hết người mang mầm bệnh lỵ Amíp không có triệu chứng lâm sàng rõ rệt. Cũng có thể phát sinh nhiễm trùng ngoài ruột tái phát, trong đó áp-xe gan (liver abscess) là phổ biến nhất, còn có trường hợp áp-xe phổi hoặc áp-xe não v.v...

阿米巴痢疾的潛伏期有多長？

Kỳ ủ bệnh của lỵ Amíp là bao lâu?

潛伏期約 2 至 4 週，但長短極為懸殊，可由數日至數年不等。
Kỳ ủ bệnh khoảng 2 đến 4 tuần, nhưng dài ngắn tùy trường hợp cụ thể, có thể từ vài ngày cho đến vài năm.

如何預防阿米巴痢疾？

Phòng ngừa bệnh lỵ Amíp như thế nào?

1. 注重手部清潔、家庭廢水之妥善處理、注意飲食衛生。
Chú trọng làm vệ sinh phần tay, xử lý tốt nước thải gia đình, chú ý vệ sinh ăn uống.
2. 帶蟲者除治療外，尤須教導注意飯前、便後洗手。
Người mang nguồn ký sinh trùng ngoài việc điều trị ra, còn cần phải hướng dẫn chú ý rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
3. 避免吃生菜及防止飲食被污染。
Tránh ăn rau sống và phòng ngừa thức ăn bị ô nhiễm.
4. 紗罩隔離食物或剝皮水果，避免被病媒 (如：蠅、蟑螂) 接觸污染。
Dùng lồng bàn cách ly thức ăn hoặc gọt vỏ hoa quả, tránh tiếp xúc vật trung gian lây bệnh (như: ruồi, gián) mà bị lây nhiễm.
5. 避免口對肛門的接觸行為。
Tránh hành vi tiếp xúc miệng với hậu môn.

衛生福利部疾病管制署及勞動部勞動力發展署 關心您
Sở Quản lý Dịch bệnh Bộ Phúc lợi vệ sinh và
Sở Phát triển nguồn nhân lực Bộ Lao động quan
tâm đến bạn

傳染病通報及諮詢專線 1922
Đường dây thông báo và tư vấn bệnh truyền nhiễm 1922
外籍勞工諮詢及申訴專線 1955
Đường dây tư vấn và khiếu nại dành cho lao động nước ngoài 1955