

附件一

受傷後傷口之預防破傷風處理措施原則

破傷風類毒素主動免疫情形 (包括 DPT、DT、Td、Toxoid)	小而乾淨之傷口		所有其他之傷口	
	Tdap or Td* (或 Toxoid)	TIG	Tdap or Td* (或 Toxoid)	TIG
*不確定或少於3次	需要	不需要	需要	需要
3次或3次以上	不需要 (但最後一劑已超過10年者需要追加)	不需要	不需要 (但最後一劑已超過5年者需要追加)	不需要

註：

1. 主動免疫疫苗：

- (1) DTaP-Hib-IPV – 白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗。
- (2) DT – 白喉、破傷風混合疫苗。
- (3) Td – 破傷風、減量白喉混合疫苗。
- (4) Toxoid – 單一破傷風類毒素。

2. 被動免疫血清：TIG – 破傷風免疫球蛋白。

3. 小於7歲之小孩，使用DPT或DTaP (如百日咳疫苗為禁忌時則用DT) 較使用單一Toxoid為佳，而大於7歲者，則使用Tdap or Td較使用單一TT(Toxoid)為佳。

4. 被動免疫血清之使用原則：TIG – 至少250 I.U.肌肉注射。

5. 必要時應以擴創術清理傷口，並使用metronidazole等抗生素。