

因應「中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」(MERS)

建議航空公司之注意事項

1040601 更新

- 一、MERS 是一種嚴重、致死率高的呼吸道疾病，但並不常見，國際最新疫情請查詢 www.cdc.gov.tw。
- 二、依據 WHO 指出，目前絕大多數病例皆具中東半島或鄰近中東地區的國家旅遊史、居住史或工作史，以及可能因接觸或吸入患病駱駝之飛沫或分泌物，或接觸確定病例而感染。
- 三、MERS 感染潛伏期約 2-14 天，感染症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難，多數呈現肺炎，部分有腹瀉症狀。
- 四、為維護旅客及機組人員健康，建議航空公司/機組人員除落實平時防範及消毒措施外，請共同加強下列措施：
 - (一) 加強旅客個人衛生：
 - 1、勤洗手保持手部衛生。
 - 2、如旅客有咳嗽與流鼻涕等呼吸道症狀時應戴口罩；當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並丟進垃圾桶。
 - 3、打噴嚏時，應用衛生紙或手帕遮住口鼻，若無衛生紙或手帕時，可用衣袖代替，衛生紙使用後應丟棄至垃圾桶。
 - (二) 遇旅客出現健康異常之初步處理及通報：
 - 1、若機上旅客有出現不適症狀如發燒及咳嗽等，機組人員請立即協助旅客配戴口罩，如旅客無法耐受時，則提供衛生紙，請旅客於咳嗽或打噴嚏時，用衛生紙遮住口鼻；旅客嘔吐或表示噁心時，請其使用嘔吐袋，並安排與其他旅客有適當區隔之座位。
 - 2、機上遇死亡或出現健康異常旅客時，應加強個人防護措施，航空器負責人依法主動向疾病管制署派駐港埠之檢疫單位通報。

- 3、必要時，航空公司配合提供生病旅客及其座位附近旅客資料，以進行防疫後續追蹤關懷，或視需要採取必要之防護措施。

(三) 機組人員懷疑自己可能暴露時的處理：

- 1、立即通知自己的主管。
- 2、自主健康管理 14 日，每天兩次體溫測量，如出現發燒、咳嗽及腹瀉等症狀，請立即撥打防疫專線 1922，並立即戴口罩速就醫，告訴醫師旅遊史與接觸史。

五、航機清潔人員指引：

- (一) 手部清潔是最重要的感控措施。
- (二) 所有沾有疑似病例的體液、分泌物等廢棄物皆視為具有傳染性。
- (三) 若航機載有疑似病例，清潔機艙或任何汙染區域時，應注意：
 - 1、戴口罩及手套。
 - 2、使用合適航空器且經相關機構驗證核可的清潔/消毒劑，擦拭乘客會觸碰的機上硬體設施表面，包括餐桌版、電視螢幕、扶手及窗戶等；如遇椅套或地毯有明顯體液或污漬，標示清楚並小心應置於感染性廢棄物垃圾袋。
 - 3、相關感染性廢棄物依據各航空公司訂定之航空器感染控制原則處理。

參考文獻：

1. World Health Organization. *Travel and transport risk assessment: guidance for public health authorities and the transport sector.* (September, 2014)
2. Centers for Disease Control and Prevention. *Infection Control Guidelines for Cabin Crew Members on Commercial Aircraft CDC Infection control guidelines for cabin crew members on commercial aircraft.* (March, 2014)
3. 疾病管制署全球資訊網 首頁 > 傳染病介紹 > 第五類法定傳染病 > 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 > 防疫措施 > 防護指引 > 大眾運輸