

~ 阿米巴痢疾 Disentri Amuba ~

預防阿米巴痢疾，勿生飲生食，落實勤洗手的良好衛生習慣。
Mencegah Disentri Amuba, Jangan Minum dan Makan Makanan yang Mentah, Menerapkan Kebiasaan Kesehatan Sering Mencuci Tangan yang Baik.

什麼是阿米巴痢疾？

Apakah itu Disentri Amuba?

1. 阿米巴性痢疾為單細胞原蟲痢疾阿米巴 (*Entamoeba histolytica*) 之腸道感染症。痢疾阿米巴主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，但痢疾阿米巴可能侵入宿主的腸壁組織，引發腸道症狀。

Disentri amuba adalah gejala infeksi usus sel tunggal protozoa disentri amuba (*Entamoeba histolytica*). Disentri amuba terutama parasit di usus, sebagian besar gejala infeksi tidak jelas, namun disentri amuba mungkin menyerang jaringan dinding usus hospes, menyebabkan gejala pada usus.

2. 阿米巴性痢疾屬世界性分布，但熱帶、亞熱帶開發中國家之感染較普遍。長期集體生活之孤兒院、教養院、收容所、監獄為易發之場所。全球估計每年因阿米巴感染症致死者為 4 ~ 11 萬，為寄生蟲感染死亡的第二位（僅次於瘧疾）。

Disentri amuba merupakan distribusi di seluruh dunia, namun infeksi di negara-negara berkembang tropis dan subtropis lebih umum. Panti asuhan, panti jompo, tempat penampungan, dan penjara untuk kehidupan kolektif jangka panjang adalah tempat yang mudah terjadi disentri amuba. Perkiraan jumlah kematian tahunan global dari infeksi amuba adalah 40 ribu hingga 110 ribu, merupakan urutan kedua dalam infeksi parasit (kedua setelah malaria).

阿米巴痢疾的感染途徑？

Jalur Infeksi Disentri Amuba?

經由糞口途徑傳染，主要藉由糞便中之囊體污染的飲用水、食物或病媒（如：蟑螂、蠅）傳染；亦可能由口對肛門的接觸行為造成。

Terinfeksi melalui rute feses, oral, terinfeksi terutama melalui air minum, makanan atau vektor penyakit (misalnya, kecoa, alat) yang terkontaminasi oleh kista di feses; juga mungkin terjadi karena tindakan kontak oral terhadap anus.

阿米巴痢疾的常見症狀？

Gejala yang Sering Dijumpai pada Disentri Amuba?

1. 輕微、慢性到嚴重腹瀉，糞便中帶粘液、血絲、間歇性下痢，腹痛、發燒、