

潛伏期約 2-3 天，最長可達 47 天。

พาหะนำเชื้อพยาธิหอยโข่ง

廣東住血線蟲感染症的傳播途徑？

ส่วนมากมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารดิบหรือไม่ได้ทำให้สุกก่อนจากพาหะนำเชื้อนี้ เช่น หอยโข่ง หอยทาก หอยน้ำจืดกุ้ง ปู กบ น้ำที่ถูกแพร่เชื้อ หรือผักสดที่ไม่ได้ชำระล้าง

人們可能感染的原因包括吃了生的或未煮熟且感染這種寄生蟲的蝸牛、淡水螺、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類、受污染的水或未清洗乾淨的生菜（如萵苣）而感染。

วิธีป้องกันการติดต่อเชื้อพยาธิหอยโข่ง

廣東住血線蟲感染症的防治方法？

1. ไม่รับประทานหอยโข่ง หอยเชอร์รี่หอยน้ำจืดทากอื่นๆ กุ้ง ปู น้ำจืดเป็นๆ อาหารเหล่านี้ควรต้มให้สุกเป็นระยะเวลา 3 ถึง 5 นาทีขึ้นไป
 2. ควรล้างผักสดให้สะอาดก่อนรับประทาน และไม่ควรรานผักสดในพื้นที่บริเวณที่แพร่เชื้อ
 3. การแช่แข็งในอุณหภูมิ -15 C เกินกว่า 24 ชั่วโมง ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิได้
 4. สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าไม่ควรสัมผัสหอยโข่งหรือหอยทากโดยตรง เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อ
 5. กำจัดสัตว์ประเภทหนู
1. 不要生吃蝸牛、淡水螺、蛞蝓等軟體動物、淡水明蝦、蟹；這些食物必須煮沸 3-5 分鐘以上再食用。
 2. 生食蔬菜必須徹底洗淨，於流行地區宜避免生食新鮮蔬菜。
 3. 冰凍-15°C 24 小時以上也可以有效的殺死幼蟲。
 4. 教育小孩勿接觸螺螄，因螺螄可能感染幼蟲。
 5. 控制鼠類。

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน
ห่วงใยท่าน

สายด่วนป้องกันโรค 1922

สายด่วนคุ้มครองแรงงานต่างชาติ 1955

衛生福利部疾病管制署及勞動部勞動力發展署 關心您

傳染病通報及諮詢專線 1922

外籍勞工諮詢及申訴專線 1955