


## 衛生福利部 疾病管制署 申請抗結核 免費藥 流程



註：  
 1. 醫院回覆單請參考附件 8-8F  
 2. 結案後，管制中心應將審查結果、醫師回覆情形登錄系統，並上傳申請單 與回覆單 掃描檔。

# 衛生福利部疾病管制署抗結核免費藥申請單

請印雙面(正面)

申請醫院：            申請醫師簽章：            醫院聯絡人：  
 聯絡電話：            傳真：            醫院地址：  
 申請日期：            開始使用免費藥日期：            (加入DOTS 有無)  
 個案姓名：            出生年月日：            身分證：  
 體重：\_\_\_\_kg (健保有無)            個案管理單位：

藥品名稱	單位	單次服用劑量 (單位數)	用法	天數	總量
Prothionamide (TBN) 250mg	錠				
Levofloxacin 750mg/500mg/100mg (請圈選)	錠				
Moxifloxacin 400mg	錠				
Cycloserine 250mg	膠囊				
Streptomycin 1gm (SM)	瓶				
Amikacin 250mg	瓶				
Kanamycin 1gm	瓶				
RHZ 75/50/150 mg (愛兒肺平-3)	錠				
RH 75/50 mg (兒立服-2)	錠				

申請免費藥理由：

- 多重抗藥性 (Isoniazid+Rifampin)    非多重抗藥性但有其他抗藥  
藥物副作用：1皮膚過敏 2肝功能不佳 3其他\_\_\_\_\_   
施打卡介苗產生不良反應  
其他\_\_\_\_\_

**※RHZ及RH為一線用藥，免病歷審查，請檢附本申請單及病人同意書(監護人代)即可一次申請足量，故無須填寫此欄；但若病人中斷使用藥品，請將剩餘之RHZ/RH退還衛生福利部胸腔病院。**

1. 本次申請免費藥為

- 初次申請免費藥 (以30天為上限)  
再次申請免費藥 (第\_\_\_\_次申請)  
情況已穩定，欲申請藥量共\_\_\_\_\_天 (以60天為上限)，請至少每個月為病人看診一次。  
經審查醫師建議後再次提出申請：是 否

2. 自主檢核是否依照申請方式檢附所需申請文件(請確實勾選並核對)：

- 初次申請：詳附醫院病歷摘要(內容須註明個案用藥史驗痰結果藥物感受性試驗結果(註明檢查醫院有無其他病史生化檢驗CXR)  
再次申請(由同一醫師審核)：詳述個案服藥情形生化檢驗治療後驗痰結果  
每月檢附治療卡

審核建議：

- 同意，依原申請資料給藥。  
同意申請，但請再增加或修正藥物種類、劑量或治療時間如下：  
不同意給藥，詳細說明：  
建議送分子快篩。

\_\_\_\_\_ 管制中心傳真：            聯絡電話

## 免費藥建議劑量及用法

藥品	每日劑量 (最大劑量)	劑量 (50公斤以下)	劑量 (50公斤以上)	每月用量	包裝
TBN 250mg	15-20 mg/kg (1 gm)	1# (bid)	1# (tid)	60-90#	1000#/瓶
Levofloxacin 500mg	<b>7.5-10mg/Kg (500~1000 mg)</b>	1# (qd)	1.5# (qd) 500-1000	30-45#	100#/盒
Moxifloxacin 400mg	400mg	1# (qd)	1# (qd)	30#	5#/盒
SM 1gm (im)	<b>15-20 mg/kg (1 gm)</b>				10瓶/盒
Cycloserine 250mg	<b>10-15 mg/kg (1 gm)</b>	1# (bid) 或 1# (tid)	1# (bid) 或 1# (tid)	60-90#	500#/瓶
Amikacin 250gm	<b>15-20 mg/kg (1 gm)</b>				25瓶/盒
<b>Kanamycin 1gm (im)</b>	<b>15-20 mg/kg (1 gm)</b>				<b>10瓶/盒</b>

註一：Streptomycin (SM) 用5cc空針抽3.4cc water打進vial搖勻 抽3cc=0.75gm 抽2cc=0.5gm

註二：本免費藥僅供應MDR-TB醫療照護體系及加入都治計畫病患使用。

## 兒童複方可溶錠RHZ及RH建議劑量及用法

藥品	劑量 (kg)				
	4-7	8-11	12-15	16-24	25+
RHZ 75/50/150mg	1# (tab)	2# (tab)	3# (tab)	4# (tab)	請參考成人劑量開立處方
RH 75/50mg					

使用注意事項:

- 藥品尚未取得我國藥證，故不符合申請藥害救濟的範圍，請各醫療院所在使用時，加強病人不良反應監測及通報；若經發現，請立即通知全國藥物不良反應通報中心，以保障病人權益。
- 為確保病人監護人知情同意之權利，藥品在使用前應先向其清楚說明與告知，並取得病人同意書；惟若情況緊急，亦應註於病歷，以供查考。

### 皮疹反應的處理方法

日期 (天)	藥物	劑量
a		
0	-	-
1	INH	50mg/day
2	INH	100mg/day
3	INH	300mg/day
4	+RMP	150mg/day
5	+RMP	300mg/day
6	+RMP	full dose
7	+EMB	200mg/day
8	+EMB	400mg/day
9	+EMB	full dose
10	+PZA	250mg/day
11	+PZA	500mg/day
12	+PZA	full dose

### 藥物性肝炎小量漸進式給藥試驗流程

日期 (天)	藥物	劑量	肝功能檢測
0	-	-	+
1	INH	100mg/day	
2	INH	200mg/day	
3~5	INH	full dose	+
6	+RMP	150mg/day	
7	+RMP	300mg/day	
8-10	+RMP	full dose	+
11	+PZA	250mg/day	
12	+PZA	500mg/day	
13	+PZA	full dose	+

a: 包含 ALT, AST, 以及 total bilirubin。

逐一加藥的過程中，可以同時使用足夠劑量的 EMB。若病人之藥物性肝炎嚴重或合併有黃疸，在成功地重新使用上 INH 及 RMP 之後，不建議嘗試加入 PZA。

# 病歷摘要 (範本)

## 一、基本資料

個案姓名： 總編號：  
通報院所： 通報日期：  
診斷醫師：

## 二、疾病史

糖尿病  心臟病  HIV陽性  肝功能異常\_\_\_\_\_  腎功能異常\_\_\_\_\_  
 塵肺症  其他 \_\_\_\_\_

## 三、結核病用藥史 (一線藥)

## 四、抗結核免費用藥使用情形

(一) 抗結核免費用藥使用原因及日期

藥物副作用 ⇨ 診斷日期\_\_\_\_\_ ⇨ 開始使用免費藥日期\_\_\_\_\_  
 多重抗藥性 ⇨ 診斷日期\_\_\_\_\_ ⇨ 開始使用免費藥日期\_\_\_\_\_

(二) 抗結核免費用藥使用種類、劑量及次數

藥物	日期	劑量	次數	藥物	日期	劑量	次數
TBN		250mg		SM		1g	
Levofloxacin		750mg		Amikacin		250 mg	
Levofloxacin		500mg		<b>Kanamycin</b>		<b>1g</b>	
Levofloxacin		100mg					
Moxifloxacin		400 mg					
Cycloserine		250mg					

## 五、藥物敏感試驗

日期					
檢驗單位					
藥物敏感試驗	INH : S/R				
	EMB : S/R				
	RIF : S/R				
	PZA : S/R				
	SM : S/R				

六、痰塗片檢查結果（至少每三個月檢查一次）

檢查日期					
痰塗片檢查	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性






七、痰培養追蹤檢查結果（至少每三個月檢查一次）

檢查日期					
痰培養檢查	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性	陰性/陽性

八、生化檢查結果（至少每三個月檢查一次）

檢查日期					
GOT					
GPT					
BUN					
Creatinine					
Uric acid					

九、CXR的治療結果（至少每三個月檢查一次）

日期:				
				

十、病程摘要

## 十一、歷次CXR

檢查日期：

貼上CXR







\_\_\_\_\_醫院 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月抗結核免費藥月報表

藥品	上月結存量	本月申請量	本月消耗量	本月結存量	次月需求量
Prothionamide (TBN) 250mg (錠)					
Levofloxacin 100mg (錠)					
Levofloxacin 500mg (錠)					
Levofloxacin 750mg (錠)					
Moxifloxacin 400mg (錠)					
Cycloserine (Cs) 250mg (膠囊)					
Streptomycin (SM) 1gm (瓶)					
Amikacin (AMK) 250mg (瓶)					
Kanamycin (KM) 1gm (瓶)					
Water for Inj 10ml 注射用水 (瓶)					
RHZ 75/50/150 mg (錠)					
RH 75/50 mg (錠)					

填表人：

電話：

主管：

收件住址：

收件人：

收件人聯絡電話：

## 衛生福利部疾病管制署申請抗結核免費藥簽收單

醫院名稱：

日期：

藥名	廠商	包裝	批號	有效期	數量	備註
Prothionamide TBN 250mg						
Levofloxacin 100mg (錠)						
Levofloxacin 500mg (錠)						
Levofloxacin 750mg (錠)						
Moxifloxacin 400mg (錠)						
Cycloserine (Cs) 250mg (膠囊)						
Streptomycin (SM) 1gm (瓶)						
Amikacin (AMK) 250mg (瓶)						
Kanamycin (KM) 1gm (瓶)						
Capreomycin 1g/vial (瓶)						
Water for Inj 10ml 注射用水 (瓶)						
RHZ 75/50/150 mg (錠)						
RH 75/50 mg (錠)						

簽收人員：

簽收日期：

備註：收到藥品，請將此表簽收後傳真02-33936149，謝謝您！

## 抗結核免費藥診療醫師回覆單

個案姓名：\_\_\_\_\_ 身分字號：\_\_\_\_\_ 申請醫院\_\_\_\_\_

於\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日經結核病診療諮詢委員審查相關申請檢附資料後，提供貴院診療建議如下，請參酌，並填寫貴院之回覆意見，傳真至 區管制中心 (FAX：0\_\_\_\_--\_\_\_\_\_)

### 審查結果：

1.  同意申請。
2.  同意申請，但請再增加或修正藥物種類、劑量或治療時間如附件。
3.  不同意給藥，詳細如附件。
4.  建議送分子快篩。

聯絡人：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

---

### 原診療醫師回覆意見：

- 同意上開諮詢委員意見，並據以診治病患。
- 不同意上開諮詢委員意見，不同意之理由請詳述：

原診治醫師簽名：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

聯絡電話：\_\_\_\_\_

疾病管制署統一採購之一般免費藥品申請須知

國內取得藥證							
Prothionamide 250mg、Levofloxacin 750/500/100mg、Moxifloxacin 400mg、Streptomycin 1gm、Cycloserine 250mg、Amikacin 250mg、(Kanamycin 1gm專案進口)							
申請原因	診治醫院	個案是否納入TMTC計畫		受理申請單位		都治種類	備註
		是	否	TMTC團隊	區管中心		
1.抗藥性結核病人（含MDR-TB、RR-TB及任三種第一線抗結核藥物抗藥） 2.一線藥治療效果不良或副作用等非抗藥性結核個案 3.其他（如：重開等）	TMTC體系醫院	V		V		V (DOTS-plus)	RR-/MDR-TB病人申請免費藥（無論是否納入團隊），務必進行DOTS-plus（每週至少5天，每天依治療處方頻率安排都治服務）。
			V	V		V (詳備註)	
	非TMTC體系醫療院所	/			V	V (詳備註)	
BCG不良反應者	所有醫療院所	不需納團隊			V	不需納都	

專案進口國內無藥證

PAS granules、Capreomycin 1 g/vial、Terizidone 250 mg/cap、Clofazimine 100 mg/cap

申請原因	診治醫院	個案是否納入 TMTC計畫		受理申請單位	都治種類	備註
		是	否			
1.抗藥性結核病人（含MDR-TB、RR-TB及任三種第一線抗結核藥物抗藥） 2.一線藥治療效果不良或副作用等非抗藥性結核個案 3.其他（如：重開等）	限TMTC 體系醫院	V		TMTC團隊	V (DOTS-plus)	RR-/MDR-TB病人申請免費藥，無論是否納入團隊，務必進行DOTS-plus（每週至少5天，每天依治療處方頻率安排都治服務）。
			V	TMTC團隊	V (詳備註)	

RHZ 75/50/150 mg/tab、RH 75/50 mg/tab

申請原因	診治醫院	個案是否納入 TMTC計畫	受理申請單位	都治種類	備註
體重未滿25kg之 1.兒童結核病人 2.BCG不良反應者	所有醫療院所	不需納團隊	區管中心	不需納都	

Bedaquiline 100mg、Delamanid 50mg

申請原因	診治醫院	個案是否納入 TMTC計畫		受理申請單位	都治種類	備註
		是	否			
pre-XDR、XDR	TMTC 體系醫院	V		TMTC團隊	V (DOTS-plus)	1.本項免費藥，限納入TMTC計畫之個案申請。 2.申請方式：醫院事先填具本署抗結核免費藥申請單，向疾管署以書面申請（免備文），或提至疾管署每季召開之「多重抗藥性結核病醫療照護體系檢討暨困難治療個案討論會」病審同意，方可使用。

### TMTC團隊醫院自行採購藥品之申請專案補助須知

Linezolid 600mg、Meropenem						
申請原因	診治醫院	個案是否納入 TMTC計畫		受理申請單位	都治種類	備註
		是	否			
抗藥性結核病人（含MDR-TB、RR-TB及任三種第一線抗結核藥物抗藥）	限TMTC體系醫院	V		TMTC團隊	V (DOTS-plus)	1. 本項免費藥，限納入 TMTC 計畫之個案申請。 2. 申請方式：醫院事先依特殊抗結核藥物專案補助申請流程（請備文），向疾管署申請同意，方可使用。