

KAMAN[®] 膠囊

藥品名稱

KAMAN[®] 膠囊

250 毫克

組成

每粒膠囊含有：

活性成分：paromomycin sulfate 357.2 毫克（相當於 paromomycin 250 毫克）

賦形劑：滑石粉、明膠、二氧化鈦

藥物包裝

16 粒膠囊盒裝

藥物分類

腸道抗微生物抗生素

適應症

1. 藥敏細菌引起的腸道感染（大腸桿菌、志賀氏菌及沙門氏菌；不含傷寒桿菌）
2. 腸道術前之腸道準備（清腸）
3. 腸道阿米巴感染症（急性和慢性）
4. 肝昏迷之輔助治療（清除產氨的腸道菌叢）

禁忌症

1. 對藥物過敏。
2. 嚴重潰瘍性病變、腸道完全或部分阻塞，以避免對藥物之吸收超過正常程度之風險
3. 勿與其他具潛在腎毒性的藥物同時使用，如 Neomycin、Kanamycin、Streptomycin、Colistin、Viomycin、Gentamicin、Cephalosporins、Polymyxin 等
4. 兩歲以下兒童
5. 腎功能不全
6. 肌無力症候群
7. 吸收不良症候群

使用注意事項

1. 長時間使用後，可能發生微生物抗藥性，此時應密切監控患者，並採取其他

適當治療

2. Paromomycin 通常不會由消化道吸收，但在腸黏膜具病變之處，可能發生非預期性的吸收異常；因此，由於本抗生素具潛在耳毒性與腎毒性，特別在長時間治療下，建議定期進行腎功能與聽力檢查
3. 不應同時使用抗膽鹼藥物，因這些藥物可能阻礙及時發現耳毒性的初期徵兆
4. 使用在腎功能受損的患者時應格外小心，特別是有腸道病變者。使用在肝功能異常的患者時亦同

警告

1. 孕婦在必要情況下應在醫生的直接監督下使用該產品。建議一旦與感染相關的症狀消失時，即應停止治療（通常治療不應超過3-5天）
 2. 罹患乳糜瀉（麩質敏感性腸病）之患者並無使用本藥之禁忌
- 請將藥品放在兒童無法觸及的地方**

劑量、使用方法和時間（除非另有處方）：

不同適應症的 Paromomycin 劑量如下：

1. 細菌性痢疾：每公斤體重 35-50 毫克（成年人 2-3 克）。建議一旦感染症狀消失，即應停止治療（通常治療不應超過3-5天）
2. 阿米巴性痢疾：25-35 毫克/公斤體重，每天三次，隨餐給藥，連續治療 5-10 天。在有抗藥性的特別情況下，醫師可增加劑量
3. 術前腸道準備（清腸）：35 毫克/公斤體重，連續 4 天
4. 肝昏迷的輔助治療：成年人每天平均 4 克，於一日中適當分次給藥，連續治療 5-6 天。

副作用

1. 當該藥物以較高劑量（超過每天 3 克）給予時，某些患者可能出現腹瀉、腹部絞痛、噁心感等
2. 在吸收異常，特別是使用高或過量劑量時，曾有腎毒性（少尿、蛋白尿、血尿等）或耳毒性（頭暈、耳鳴、聽力喪失）現象之報告
3. 曾有過敏反應，如不同部位的皮疹之罕見報告

若發生未記載在本說明書上的任何副作用，請告知您的醫師或藥師

警告：請勿在超過本包裝所指示的保存日期下，服用本藥物

最後更新：2017 年 6 月