

急性病毒性A型肝炎 (Acute Hepatitis A)

一、臨床條件

經醫師臨床診斷為急性A型肝炎，並同時具有下列二項條件：

- (一) 出現急性發作症狀：包括發燒、全身倦怠、噁心、嘔吐、腹部不舒服等。
- (二) 黃疸或ALT上升。

二、檢驗條件

血清學A型肝炎IgM抗體檢測陽性。

三、流行病學條件

具有下列任一個條件：

- (一) 曾與確定病例有密切接觸、同住。
- (二) 食用受污染的水、食物等，或曾與確定病例暴露共同感染源。

四、通報定義

符合臨床條件、檢驗條件及流行病學條件任一者。

五、疾病分類

(一) 可能病例：

NA

(二) 極可能病例：

無臨床條件，但符合檢驗條件。

(三) 確定病例：

具有下列任一個條件：

1. 符合臨床條件和檢驗條件。
2. 符合臨床條件，且與經實驗室證實之確定病例具有流行病學之關聯。

六、檢體採檢送驗事項：

採檢項目	檢體種類	採檢目的	採檢時機	採檢規定	運送條件	注意事項
急性病毒性 A 型肝炎	血清	抗體檢測	急性期 (立即採); 恢復期 (距第一次採血日 14 日後)	以無菌試管收集 3 mL 血清	2-8 °C (B 類感染性物質 P650 包裝)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢體勿加任何添加物。 2. 第 1 次檢查時, 如 IgM 與 IgG 其中之一檢驗結果介於陰性與陽性臨界值者, 需採恢復期血清。 3. 血清檢體見 2.8.3 及 2.8.4 備註說明, 血清採檢步驟請參考第 3.3 節。 4. 陽性檢體, 請後送疾病管制署保存。
	糞便	病原體檢測	發病後 14 日內之確定病例或疑似群聚案件時	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固體糞便: 以糞便專用採檢瓶挖取大於 3 g (約龍眼粒大小) 糞便中心部分。 2. 液狀糞便: 以無菌吸管取樣大於 5 mL, 裝入糞便專用採檢瓶。 	2-8 °C (B 類感染性物質 P650 包裝)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每一群聚事件採檢送驗以一次為限, 每次不超出 8 件檢體, 但經本署流病班派員調查之群聚事件不受此限。 2. 通報送檢時請檢附初步疫調資料, 須註明群聚編號, 通報 3 日內請補齊詳細疫調資料。