

## 新冠 XBB.1.5 疫苗 Q&A

2023/10/04

### Q：XBB.1.5 COVID-19 疫苗怎打？

A：考量國內本土併發症中 65 歲以上民眾佔 7 成以上，為降低感染 COVID-19 後併發重症和死亡風險，XBB.1.5 COVID-19 疫苗接種對象實施期程如下：

1. 自 112 年 9 月 26 日優先開放 65 歲以上民眾接種；
2. 自 112 年 10 月 2 日起再開放醫護人員接種；
3. 自 112 年 10 月 11 日起開放滿 6 個月以上全民接種。

### 【疫苗接種 QA】

### Q：為什麼要接種 XBB.1.5 COVID-19 疫苗？

A：世界衛生組織(WHO)112 年 5 月提出建議使用單價 XBB.1 衍生譜系作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力，且 COVID-19 疫情仍持續，國內外主要流行病毒株多為 XBB 衍生。另依莫德納實驗報告，XBB.1.5 COVID-19 疫苗對於目前正流行的變異株，包括 XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2，以及 EG.5.1 等皆具免疫保護力，爰建議民眾踴躍施打，儘快提升免疫保護力。

### Q：XBB.1.5 COVID-19 疫苗該接種幾劑？

A：依民眾接種年齡及 COVID-19 疫苗接種史，原則為滿 5 歲以上民眾，無論是否曾接種 COVID-19 疫苗，僅須接種 1 劑；滿 6 個月至未滿 5 歲幼兒未曾接種者須接種 2 劑。依接種年齡提列如下：

1. 滿 6 個月至未滿 5 歲幼兒
  - (1) 未曾接種者：建議接種 2 劑，兩劑間隔 4 週(28 天)以上。
  - (2) 曾接種 1 劑單價或雙價莫德納疫苗基礎劑：接種 1 劑，與前 1 劑間隔 4 週(28 天)以上。

- (3) 曾接種 1-2 劑單價 BNT 疫苗基礎劑，接續完成 3 劑接種：  
接種 1-2 劑，第 1-2 劑間隔 4 週(28 天)以上，第 2-3 劑間隔 8 週(56 天)以上。
- (4) 已完成基礎劑接種：接種 1 劑，與前 1 劑間隔 12 週(84 天)以上。
2. 滿 5 歲以上民眾：接種 1 劑〔曾接種者與前 1 劑間隔至少 12 週(84 天)〕。

**Q：接種 COVID-19 疫苗需要付費嗎？**

A：疫苗免費，合約醫療院所不得向民眾收取接種診察費，但掛號及耗材等醫療相關費用得依據各縣市所訂收費標準酌收。

**Q：我曾感染過 COVID-19，我仍要接種 XBB.1.5 COVID-19 疫苗嗎？**

A：建議確診者可自發病日起或確診日(無症狀感染者)起 12 週(84 天)且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。

**Q：XBB.1.5 COVID-19 疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可否一起接種？**

A：COVID-19 疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時分開不同部位接種(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少 2.5 公分)，亦可間隔任何時間接種。

### **【接種注意事項】**

**Q：接種 COVID-19 疫苗要帶什麼證件？**

A：在前往接種 COVID-19 疫苗前，請應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

**Q：接種 XBB.1.5 COVID-19 疫苗後要注意什麼？**

A：接種後請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

**Q：哪些人不適合接種 XBB.1.5 COVID-19 疫苗(接種禁忌症)？**

A：對於疫苗所含活性物質或賦形劑有嚴重過敏反應史，或先前接種莫德納原病毒株/雙價疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不予接種。

**【疫苗接種院所查詢】**

**Q：哪裡可以接種公費 XBB.1.5 COVID-19 疫苗？**

A：有關各縣市提供公費 COVID-19 疫苗接種服務的醫療院所，可至首頁>傳染病介紹>第四類法定傳染病>嚴重特殊傳染性肺炎>COVID-19 疫苗>「COVID-19 疫苗接種院所」或「COVID-19 防治一網通(疫苗地圖)」項下查閱。相關接種資訊，請以各縣市公布資訊為主。