

潛伏結核感染治療衛教單張

您好：

台端（貴子弟）因曾暴露結核菌，依法進行潛伏結核感染檢驗及胸部 X 光檢查，及醫師臨床身體檢查評估。結果顯示，雖已遭受結核菌感染，但目前處於被感染未發病的狀況，即潛伏結核感染。您（貴子弟）不需擔心及驚慌會傳染給任何人，因為此時潛伏在身體內之結核菌，被體內免疫力抑制住，對於周遭的親友是沒有傳染力的，然而潛藏在體內結核菌會伴隨您（貴子弟）一生，終其一生約有 5-10% 機會發病，通常以感染後，一年內的發病機率最高。發病與否，會因個人的健康狀況、免疫狀態等因素而不同。為了有效減少日後發病的可能性—**接受潛伏結核感染治療**，是讓潛藏在體內結核菌不擾亂您（貴子弟）未來生涯規劃的不二法門。

經過完整的潛伏結核感染治療，有高達 90% 以上的人可避免日後發病。不但避免未來發病時傳染給同住者與親友，也解決萬一發病需面對長期合併服用多種抗結核藥物及所產生不適的副作用。

接受治療應注意事項如下：

- 一、治療的方式：接受由「關懷員」親自送藥關懷，醫師將依您（貴子弟）的狀況，選擇下列治療方式之一：(一)每週服用速克伏（INH+rifapentine）1 次，完成 12 次劑量，計 3 個月的藥物治療、(二)每日服用 isoniazid（INH），完成 9 個月的藥物治療、(三)每日服用 rifampin（RMP），完成 4 個月的藥物治療或(四)每日服用 INH+RMP，完成 3 個月的藥物治療，並藉由正確有效的服藥，可達到最佳保護力，減少日後發病。
- 二、治療過程中，由於服用的不是食品是藥物，仍有相當低的機會有可能產生副作用。雖然發生機會很低，但如果您有任何不舒服的情況，如發燒、頭暈、噁心、食慾不振、右上腹部疼痛、手腳麻木、眼白及皮膚變黃、皮膚癢疹、急性過敏反應等症狀，請告訴關懷員或衛生所護理人員，並請儘速返回診治醫師處，進行判斷是否繼續服藥。
- 三、治療過程中，請按月依醫師預約時程親自到診間進行追蹤。
- 四、如果本單張未能解答您所有問題，或者您讀後仍有任何疑慮，請隨時向您的關懷員、醫師或護理師查詢。

若您（或貴子弟）對於潛伏結核感染治療等事項仍有疑問，請撥打

_____（ _____ 衛生所（局）的承辦人 _____ ），

我們將儘速為您說明。



衛生福利部疾病管制署關心您的健康