


# BioNTech(BNT, 品名 COMIRNATY)疫苗

## 幼兒劑型、兒童劑型及青少年/成人劑型之外觀/劑量/使用比較表

111/09/09 版

適用年齡	<b>幼兒劑型</b> ≥ 6 個月~<5 歲	<b>兒童劑型</b> ≥ 5~<12 歲	<b>青少年/成人劑型</b> ≥ 12 歲	說明
外盒包裝	10 瓶/盒 	10 瓶/盒 	49 瓶/盒 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未使用前置於原包裝盒內避光冷儲</li> </ul>
外觀				
瓶蓋	栗紅蓋/深棕標框 英標品名 Comirnaty	橘蓋/橘標框 英標(品名 Comirnaty)	紫藍蓋中/英文標示	

適用年齡	幼兒劑型 ≥ 6 個月~<5 歲	兒童劑型 ≥ 5~<12 歲	青少年/成人劑型 ≥ 12 歲	說明
稀釋前	0.4ml 	1.3ml 	0.45 ml 	
每瓶稀釋量	2.2 ml	1.3ml	1.8ml	稀釋液: 0.9%生理食鹽水注射液
劑型(稀釋後)	10 劑/瓶 	10 劑/瓶 	6 劑/瓶 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 栗紅/橘蓋稀釋後幾乎滿瓶</li> <li>➢ 紫蓋稀釋後約 2/3 瓶量，有點白濁</li> </ul>
每劑含量	3mcg	10mcg	30mcg	
每劑接種劑量	0.2ml	0.2ml	0.3ml	➢ 採肌肉注射
接種時程	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 基礎 3 劑，第 1、2 劑間隔至少 4 週，2、3 劑間隔至少 8 週</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 基礎劑 2 劑，兩劑間隔 4-8 週以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 基礎劑 2 劑，兩劑間隔 12 週(12-17 歲)</li> <li>➢ 追加劑 1 劑，與最後一劑基礎劑間隔至少 12 週</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUA 核准基礎劑 2 劑，兩劑接種間隔至少 21 天；≥18 歲間隔至少 3 個月追加第 1 劑，風險族群再間隔 12 週可追加第 2 劑</li> <li>• 即將滿 5 歲其第 1、2 劑或第 2、3 劑介於不同年齡劑量之幼童，建議其接種間隔依前一劑接種時之規範接種，接種劑量則以</li> </ul>

				<p>接種當下半年齡依仿單建議劑量接種。</p>
<p>冷儲條件 /效期</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ -90~-60°C冷凍儲存 12 個月(1110819 版中文說明書),如外盒/瓶身標示效期</li> <li>➢ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C可冷儲 10 週(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> <li>➢ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C~ 30°C : 12 小時</li> <li>• -2°C~2°C : 10 週</li> </ul> </li> <li>➢ 稀釋後 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2°C~30°C下 12 小時內使用完畢</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ -90~-60°C冷凍儲存 12 個月(1110621 版中文說明書),如外盒/瓶身標示效期</li> <li>➢ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C可冷儲 10 週(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> <li>➢ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C~ 30°C : 12 小時</li> <li>• -2°C~2°C : 10 週</li> </ul> </li> <li>➢ 稀釋後 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2°C~30°C下 12 小時內使用完畢</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ -90~-60°C冷凍儲存 12 個月,如外盒/瓶身標示效期</li> <li>➢ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C可冷儲 1 個月 ※(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> <li>➢ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• -3 °C~2 °C : 24 小時</li> <li>• 8°C~ 30°C : 4 小時 ; 30 °C : 2 小時</li> </ul> </li> <li>➢ 稀釋後 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2°C~30°C下 6 小時內使用完畢</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 避光儲存，解凍後不能再冷凍</li> <li>• 稀釋前應檢查小瓶內液體是白色到灰白色</li> <li>• 稀釋後的液體如有顆粒或變色，不能使用</li> <li>• 疫苗原廠效期可能採「月/日/年」或「日/月/年」標示，以疾病管制署下貨之 Email 通知及 NIIS 所載批號效期為準，如有疑問請洽轄區衛生局/所</li> </ul>
<p>稀釋前/後注意 事項</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 稀釋前/後各輕輕上下倒置疫苗瓶 10 次混合均勻</li> <li>➢ 不要搖晃</li> </ul>

# BioNTech(BNT)疫苗各劑次跨年齡接種之接種建議

- 接種間隔：依前一劑次接種時年齡之接種間隔
- 接種劑量及廠牌：依該劑次接種時年齡之核准廠牌及接種劑量

第 1、2 劑未滿 5 歲，第 3 劑滿 5 歲

第 1 劑未滿 5 歲，第 2、3 劑滿 5 歲

第 1 劑 幼兒劑型

第 2 劑 幼兒劑型

第 3 劑 兒童劑型



間隔  
→  
至少 4 週



間隔  
→  
至少 8 週



第 1 劑 幼兒劑型

第 2 劑 兒童劑型

第 3 劑 兒童劑型



間隔  
→  
至少 4 週



間隔  
→  
至少 8 週

