

日期：2019 年第 36–37 週 (2019/9/1–9/14)

DOI: 10.6524/EB.201909_35(18).0003

疫情概要：

全國腸病毒門急診就診人次持續上升，目前處流行高峰期；近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 群為多，腸病毒 71 型持續活動。我國北部首見屈公病本土群聚，境外移入病例感染國家以緬甸為主；南高新增登革熱本土群聚區，另出現第一型感染個案。

鄰近我國之泰國、香港、日本、韓國及中國大陸腸病毒疫情處高峰或流行期；東南亞及南亞多國登革熱疫情處高峰；另泰國及緬甸屈公病疫情持續；紐西蘭今年麻疹疫情較往年嚴重，基於當地感染風險升高，我國 9/12 提升該國麻疹旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)；南韓 A 型肝炎疫情持續上升，今年病例數已逾萬例，高於近 5 年各年總數。

一、腸病毒**(一) 國內疫情**

1. 腸病毒就診人次：第 37 週全國腸病毒門急診就診計 20,585 人次，較第 36 週上升 6.5%；近期就診人次持續上升，疫情處流行高峰期。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 3 例，均感染腸病毒 71 型 (EV71 型)；今 (2019) 年累計 37 例，以感染 EV71 型為多 (28 例)，其他分別感染腸病毒 D68 型、克沙奇 A6 型、克沙奇 A10 型各 2 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 B5 型及伊科病毒 11 型各 1 例。
3. 近 4 週社區腸病毒型別以克沙奇 A 群為多，EV71 型持續活動；今年累計 315 例 EV71 型個案，高於 2016 至 2018 年同期。



圖一、2018-2019 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

國家	累計數	疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國		處高峰	9/9	48,766(1)	高於2017-18同期
香港		處高峰	9/7	急診就診千分比:3.0	高於2017-18同期
日本		處流行期	9/8	定醫平均報告3.11	高於2018同期
韓國		下降，處流行期	9/7	門診就診千分比17.9	高於2014-18同期
中國大陸		下降，處流行期	9/8	1,486,340(17)	
馬來西亞		高於平均值	9/7	42,500(0)	
新加坡		低於閾值	9/7	日平均病例數:18	高於2018同期

二、登革熱


(一) 國內疫情

1. 本土病例

(1) 新增 7 例，其中高雄市 4 例、台南市 3 例；國內今年累計 84 例，分別為高雄市 55 例、台南市 25 例、新北市 2 例、桃園市及台北市各 1 例。

(2) 台南市北區（雙安里）及高雄市鳳山區（國富里、海洋里）為新增群聚區；另南高兩市均出現感染登革病毒第一型個案。

2. 境外移入病例：今年累計 385 例，90%以上感染地為東南亞國家；近一個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。



圖二、2018-2019 年登革熱病例通報趨勢

(二) 國際疫情


國家	趨勢 疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
菲律賓	處高峰	8/24	249,332(1,021)	高於去年同期
斯里蘭卡	處高峰	9/16	46,126	高於2010-16及去年同期
泰國	處高峰	9/9	85,520(94)	高於2016-18同期
馬來西亞	下降·處高峰	9/16	96,278(137)	高於去年同期
柬埔寨	下降·處高峰	8/16	逾50,000	高於2012-18同期
寮國	下降·處高峰	8/16	24,758(51)	高於2013-18同期
馬爾地夫	下降·處高峰	9/3	3,706	高於2016-18同期
中國大陸	上升·處流行期	8/4	2,970(0)	高於2014-18同期
新加坡	下降·處流行期	9/16	11,868	高於2015-18同期

1. 越南：東南部同奈省今年截至 8 月累計逾 11.6 萬例（2 例死亡），胡志明市疫情上升，截至 8 月累計近 40,000 例，皆高於去(2018)年同期。
2. 印度：南部泰倫加納邦海德拉巴市(Hyderabad) 9 月處疫情高峰，該邦今年已累計逾 4,500 例。
3. 印尼：爪哇島井裡汶(Cirebon)今年截至 9/9 累計 1,100 餘例（17 例死亡），較去年全年總數 215 例為高。

三、屈公病

(一) 國內疫情

1. 本土病例：新增 9 例，均居住新北市，其中中和區 7 例、新店區及新莊區各 1 例，均有中和區國強嶺及周邊區域活動史，為群聚。國內今年累計 11 例本土病例（新北市中和區 8 例，新店區、新莊區及土城區各 1 例），含 1 起群聚案（累計 10 例）。
2. 境外移入病例：今年累計 67 例，為自 2007 年 10 月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸 47 例(70%)、泰國 10 例、馬爾地夫 5 例、印尼 2 例，菲律賓、馬來西亞及印度各 1 例；近一個月新增個案感染國家以緬甸為多。



圖三、2007-2019 年屈公病本土及境外移入確定病例發病趨勢


(二) 國際疫情

1. 南亞／東南亞地區

- (1) **泰國**：疫情處流行期，近期病例仍以南部為多；今年截至 9/8 累計 49 府報告近 7,300 例，較去年同期 323 例為高。
 - (2) **馬爾地夫**：疫情下降，8 月新增 36 例，較 7 月 107 例為低；今年截至 9/3 累計 1,400 餘例。
 - (3) **馬來西亞**：近期疫情下降；今年截至 8/31 累計 468 例，高於去年同期。
 - (4) **緬甸**：自 2011 年來今年首次出現病例，已確診 26 例，多來自首都內比都(Nay Pyi Taw)、克欽邦(Kachin)及德林達依省(Tanintharyi)。
2. **非洲地區**：衣索比亞於今年 8 月爆發疫情，近期病例數明顯上升，今年已累計 20,000 例，病例分布於索馬利亞州(Somali)、阿法爾州(Afar)、南方部落州(Southern Regional)及德雷達瓦市(Dire Dawa)。
3. **美洲地區**：巴西疫情下降，惟去年 12/30 至今年 8/24 累計逾 11 萬例可能病例，高於去年同期（逾 76,000 例），病例分布以東南部里約熱內盧州(Rio de Janeiro)逾 76,000 例為多。

四、麻疹

- (一) **國內疫情**：新增 4 例，其中 2 例為國內感染，均為散發個案，另 2 例分別自泰國及紐西蘭境外移入；今年累計 127 例，高於 2015–2018 年同期病例數，其中 78 例為國內感染、另 49 例為境外移入，感染國家以越南 17 例、泰國 13 例及菲律賓 7 例為多；出國目的以旅遊 27 例為最多，其次為商務及探親；今年累計 17 起群聚。



圖四、2018–2019 年麻疹本土及境外移入確定病例發病趨勢

(二) 國際疫情

1. 紐西蘭

- (1) 疫情自今年 5 月開始上升；今年截至 9/13 累計 1,275 例，已高於 2006 年來全年總數，病例中逾 3 成需住院治療，曾完整接種疫苗者未達 1 成，近 4 週病例分布以奧克蘭地區馬努考郡(Manukau) 逾 6 成為多。
- (2) 基於當地感染風險升高，我國於 9/12 將該國麻疹旅遊疫情建議提升至第一級注意(Watch)。

2. 歐洲

- (1) 近期疫情趨緩，今年截至 8 月至 9 月初，以烏克蘭累計報告約 57,700 餘例（19 例死亡）為最高，其次為羅馬尼亞 2,614 例及法國 2,429 例，另北馬其頓共和國、波蘭、義大利及保加利亞等病例數皆已超過千例。
 - (2) 近一個月新增病例數以烏克蘭 885 例為多，其次為羅馬尼亞 281 例及法國 116 例，歐洲疾病預防與控制中心(ECDC)評估歐洲地區近期仍具傳播風險。
3. **泰國**：疫情持續，今年截至 9/6 累計報告 4,539 例，14 例死亡，病例數高於去年同期，發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高。
 4. **越南**：近期疫情下降，今年截至 8 月底累計約 6,100 例確診，惟仍高於去年全年總數。

五、A 型肝炎－南韓

- (一) 疫情自今年初持續上升，5 月底開始每週新增病例數均逾 500 例，今年截至 9/7 累計報告 14,325 例，高於 2014–2018 年各年總數，自 2009 年(15,231 例)後，再次累計逾萬例；近 4 週病例分布以京畿道 4,450 例為多，其次為首爾 2,648 例及大田 2,084 例。
- (二) 韓國疾病預防與控制中心(KCDC)表示，今年夏季爆發疫情主因為食用受污染之貝類，部分商品為自中國大陸進口，呼籲民眾停止食用及銷售，並將全面檢測相關產品。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國 大陸	廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治 區、江蘇省、湖南省、雲 南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2019/5/6

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、 馬來西亞、菲律賓、寮國、 越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 3 個國家： 斯里蘭卡、馬爾地夫、 印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/6/18
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、 越南、泰國、印尼、緬甸、 紐西蘭 、印度、哈薩克、 以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、 奈及利亞、幾內亞、 馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、 喬治亞、俄羅斯、波蘭、 北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/9/12
中東呼吸 症候群冠狀 病毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、 約旦、卡達、伊朗、阿曼、 科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及 利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 7 國、美洲 21 國／屬 地、大洋洲 3 國／屬地、 非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/2
	亞洲 5 國、 美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/8/2
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/12/26

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本、中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/6/19
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/8/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地 址：臺北市中正區林森南路 6 號

電 話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網 址：<http://www.cdc.gov.tw/>