

~ 霍亂 อหิวาตกโรค ~

預防霍亂，勿生飲生食，落實勤洗手的良好衛生習慣。

ป้องกันโรคอหิวาตกโรค โปรดอย่าดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ช้อนล้างมือและมีสุขอนามัยที่ดี

什麼是霍亂？

อะไรคือโรคอหิวาตกโรค？

1. 霍亂是由霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病。

อหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดวิบริโอ โคลเลรี ทำให้เกิดโรคระบาดในลำไส้เบคที่เรียฉับพลัน

2. 霍亂為全球性的疾病，世界各地均有病例發生，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區。

อหิวาตกโรคเป็นโรคที่มีอยู่ทั่วจักรวาล ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนา

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึงหรือเขตที่สภาพแวดล้อมไม่ดี

霍亂的感染途徑？

สาเหตุการเกิดอหิวาตกโรค？

1. 霍亂可透過食用受污染的食物或水而傳播。

อหิวาตกโรคสามารถแพร่เชื้อผ่านอาหารหรือน้ำ ดื่มน้ำปนเปื้อนแบคทีเรีย

2. 霍亂弧菌可存在污水中相當長的時間，生食受霍亂弧菌污染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），即可能遭受感染或引發疫情。

แบคทีเรียชนิดวิบริโอ โคลเลรีสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ ปนเปื้อนได้เป็นเวลายาวนาน

ดื่มน้ำ หรืออาหารทะเล(โดยเฉพาะประเภทหอย)จากแหล่งน้ำ ที่มีเชื้อ อออยู่โดยไม่ได้ต้มให้สุก จะทำให้ติดเชื้อและเกิดเป็นโรคร้ายแรงได้

霍亂的常見症狀？

อาการของอหิวาตกโรค？

1. 感染霍亂常見症狀有：無痛性大量腹瀉、嘔吐、快速脫水等，腹瀉呈現水性米湯樣。

อาการที่มักพบเห็นคือ: ท้องร่วงหนักโดยไม่มีความรู้สึกเจ็บ อาเจียน ร่างกายสูญเสีย น้ำ ลักษณะของอุจจาระจะเหมือนน้ำ ข้าวข้าว

2. 若患者未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水和休克而在數小時內死亡。

หากผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดทันเวลาอาจทำให้เสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ อย่างหนัก

霍亂的潛伏期有多長？

ระยะเวลาฟักตัวของอหิวาตกโรค？

霍亂潛伏期為數小時至 5 天，又以 2~3 天為常見。

อหิวาตกโรคใช้เวลาฟักตัวหลายชั่วโมงถึง 5 วัน โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง

如何預防霍亂？

วิธีป้องกันอหิวาตกโรค？