

A 型肝炎疫苗接種須知

■ 認識疾病

- A 型肝炎是感染 A 型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，其主要是經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒污染的食物或與感染者密切接觸。
- 感染 A 型肝炎之症狀包括疲倦、厭食、發燒，黃疸、尿的顏色變濃、上腹部疼痛等。大多數會自然痊癒，然後產生抗體。惟極少數病例會發生猛爆型肝炎，嚴重的話可能致死，致死率約千分之三。
- 接種 A 型肝炎疫苗為有效的預防方法。

■ 認識疫苗

- A 型肝炎疫苗的安全性及接種效益很高，一般接種 1 劑疫苗後，約 95% 以上可產生保護抗體，完成 2 劑疫苗接種，可提供 20 年以上的保護力。
- 國內現行上市的 A 型肝炎疫苗有三種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿 12 個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是 2 劑，2 劑間隔至少 6 個月。

■ 幼兒 A 型肝炎預防接種計畫

本計畫所用疫苗由財團法人寶佳公益慈善基金會捐贈

- 實施時間：民國 107 年 1 月 1 日起。
- 實施對象：民國 106 年 1 月 1 日(含)以後出生，年滿 12 個月以上之幼兒。
- 接種地點：全國提供預防接種服務之衛生所(室)及各縣市合約之醫院診所。
- 攜帶證件：兒童健康手冊、健保 IC 卡。

■ 接種時程與接種間隔

- 幼兒常規接種時程：應接種 2 劑
出生滿 12-15 個月接種第 1 劑，間隔至少 6 個月接種第 2 劑。
- 可與其他活性減毒或不活化疫苗同時(分開不同部位)或間隔任何時間接種。

■ 哪些人不適合或宜暫緩接種 A 型肝炎疫苗及應注意事項

接種禁忌	注意事項
<ul style="list-style-type: none">• 對本疫苗之任何成分(含賦形劑、neomycin)曾有嚴重過敏反應者。	<p>下列狀況者，宜待病情穩定後或經醫師評估後再接種：</p> <ul style="list-style-type: none">• 發燒或正患有急性中重度疾病者。• 孕婦

■ 接種後可能發生的不良反應及因應方式

- 一般為注射部位疼痛、紅、腫、頭痛、發燒、肌痛、煩躁不安、食慾不振及腸胃道不適等反應，會在數天內恢復。至於嚴重過敏等症狀則極為罕見。
- 如上述症狀持續未獲改善，應儘速就醫處理，並請醫師通報衛生單位。

如您仍有預防接種等相關問題，歡迎就近洽詢所在地衛生局(所)，或至疾病管制署網站

www.cdc.gov.tw查詢，亦可撥打防疫諮詢專線 1922 洽詢。



衛生福利部疾病管制署 關心您