

速剋流口服懸液用粉劑(每毫升含 6 毫克 Oseltamivir phosphosate) 病患用藥資訊

1. 適應症

- 成人和兒童(包含足月新生兒)的流行性感冒之治療。
- 成人和 1 歲或以上兒童的流行性感冒之預防。

2. 用法用量：請依醫囑服用

3. 速剋流(Oseltamivir Phosphate)口服懸液用粉劑的配製

依下列說明配製速剋流口服懸液劑(原包裝為粉末)。

第 1 步驟 拍打緊蓋的瓶子幾次以鬆散粉末。

第 2 步驟 使用以毫升單位的量杯量取 55 毫升的水。

第 3 步驟 將全部 55 毫升調配用的水加入瓶子中，蓋緊兒童安全瓶蓋，搖晃瓶子 15 秒至均勻狀態。

第 4 步驟 調配後口服懸液劑每 60 毫升含有 360 mg Oseltamivir (6 mg/ml)，外觀為白色懸液，有綜合水果香味。調配後可冷藏於 2 至 8°C 下 17 天或存放於室溫 25°C 下 10 天，請在瓶身上加註調配後口服懸液劑保存期限。

第 5 步驟 使用可測量至毫升數之口服調配器，並依第 5 項的用法用量服用口服懸液劑。

註：粉末若先由藥師調製，門診病人拿回家前，有藥品降解的風險。

4. 儲存

本品未開封請儲存於 25°C 以下之環境。

5. 未使用/過期藥品的處理

藥物排放至環境中須減到最小量。藥物不可經由廢棄水處理且避免以家庭廢棄物處理。應依主管機關規定，將藥品帶回原就診醫療院或各社區藥局回收，以醫療廢棄物處理

6. 注意事項

- 須嚴密地監測流感病人(特別是小孩和青少年)之不尋常行為之徵兆。
- 腎功能不全的病人，其劑量調整請參閱包裝內說明書的特殊劑量指示。
- 遺傳性果糖耐受不良的患者服用 75 mg 劑量速剋流口服懸液，可能導致消化不良和腹瀉。

7. 常見不良反應與處理方式

- 最常通報的藥物不良反應為噁心、嘔吐及頭痛，這些藥物不良反應大部份都是單一事件，發生於治療的第一天或第二天，並且會在 1-2 天內自然消退。

請放置於孩童無法取得之處

本藥須由醫師處方使用。

藥 商：微確藥品有限公司

地 址：台北市內湖區成功路四段 168 號 10 樓

電 話：02-87978235