

ระยะเวลาฟักตัวของโรคบิดอะมีบา?

潛伏期約 2 至 4 週，但長短極為懸殊，可由數日至數年不等。

ระยะเวลาฟักตัวตั้งแต่ 2~4 สัปดาห์ แต่ยังไม่มียุคระยะเวลาที่แน่นอน อาจใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายปีก็เป็นได้

如何預防阿米巴痢疾？

วิธีป้องกันโรคอะมีบา?

1. 注重手部清潔、家庭廢水之妥善處理、注意飲食衛生。

ดูแลความสะอาดมือ การจัดการน้ำเสียในบ้าน ระวังระวังเรื่องอาหารการกินการดื่ม

2. 帶蟲者除治療外，尤須教導注意飯前、便後洗手。

ผู้ที่ติดเชื้อ นอกจากจะรับการบำบัดแล้ว ต้องระวังการล้างมือก่อนอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ เป็นพิเศษ

3. 避免吃生菜及防止飲食被污染。

หลีกเลี่ยงการกินผักสดและป้องกันอาหารติดเชื้อ

4. 紗罩隔離食物或剝皮水果，避免被病媒（如：蠅、蟑螂）接觸污染。

ใช้ตาข่ายปิดอาหารหรือผลไม้ปอกเปลือก ป้องกันแมลง(เช่น แมลงวัน แมลงสาป)นำเชื้อโรค

5. 避免口對肛門的接觸行為。

หลีกเลี่ยงการสัมผัสปากกับรูทวารหนัก

衛生福利部疾病管制署及勞動部勞動力發展署 關心您

กรมอนามัยและสวัสดิการสำนักงานควบคุมโรคและกระทรวงแรงงานสำนักงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน

傳染病通報及諮詢專線 1922

สายด่วนแจ้งเชื้อ ระบาด 1922

外籍勞工諮詢及申訴專線 1955

สายด่วนข้อมูลแรงงานต่างด้าว 1955