

**ស្រុក \_\_\_\_\_ (ក្រុង) \_\_\_\_\_**  
**លិខិតស្នើសុំក្រចិត្ត និងសេចក្តីជូនដំណឹងព្រមនឹងការពន្យល់នៃ**  
**ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ**

ឪពុកម្តាយសិស្សជាទីគោរព៖

សាលាយើងខ្ញុំនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ទីរ  
សុខាភិបាលខេត្ត(ក្រុង)យើង ក្រុមវិទ្យុបណ្ឌិតផ្តល់  
ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃ \_\_\_\_\_  
ខែ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ២០២៣។ ជាពិសេសសាលាយើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹង  
ហើយស្នើសុំការយល់ព្រមរបស់លោកអ្នក  
សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោមរួចហើយសរសេរឃ្លាពេញលិខិតស្នើសុំក្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង  
បន្ទាប់មកឱ្យកូននាំយកទៅប្រគល់ជូនសាលាវិញ  
សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងសហការរបស់លោកអ្នក!

**《 តើអ្វីទៅហៅថាជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ 》**

ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយជាជម្ងឺកើតមកពី [ដោយវីរុសគ្រុនផ្តាសាយ]  
នាំឱ្យមានក្នុងផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលមកពីវាមានភាពខុសពីជម្ងឺផ្តាសាយធម្មតា តាមធម្មតាមានរោគសញ្ញាច្បាស់ជាង ហើយអំឡុងពេលក៏យូរវែងជាង។  
រោគសញ្ញាទូទៅរួមមានដូចជា គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ នឿយហត់ ហៀរសំបោរ  
ឈឺបំពង់ក និងក្អកជាដើម ជួនកាលនឹងបណ្តាលឱ្យហកជម្ងឺ  
នឹងអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់។ ហកជម្ងឺដែលធ្លាប់ជួបដូចជាជម្ងឺរលាកសួត  
ជម្ងឺផ្សេងទៀតដូចជារលាកត្រចៀកកណ្តាល ជម្ងឺរលាករន្ធច្រមុះ រលាកខួរក្បាល  
ជម្ងឺខួរក្បាល រលាកទងបេះដូង រោគសញ្ញានិងពន្លឺរស្មី  
និងជម្ងឺរ៉េនិងជម្ងឺឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀត។

**《 តើជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយឆ្លងតាមរបៀបអ្វី 》**

ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបណ្តាលមកពីក្អក  
កណ្តាលមានវីរុសឆ្លងមេរោគដល់មនុស្សជុំវិញ  
ហើយក៏មានលទ្ធភាពឆ្លងតាមរយៈការប៉ះមាត់និងច្រមុះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានប៉ះ  
ពាល់នឹងមេរោគគ្រុនផ្តាសាយនៅលើផ្ទៃនៃវត្ថុដែលមានផ្ទុកវីរុស។  
មុនពេល១ថ្ងៃនឹងកើតជម្ងឺ ឬក្រោយពេលកើតជម្ងឺ៣-៧ថ្ងៃ  
អ្នកមានជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយក៏មានលទ្ធភាពឆ្លងជម្ងឺដល់អ្នកផ្សេងទៀត  
ចំពោះក្មេងៗ អំឡុងឆ្លងជម្ងឺកាន់តែយូរ។

**《 សារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយសំរាប់សិស្ស 》**

យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា  
សិស្សានុសិស្សងាយឆ្លងមេរោគគ្រុនផ្តាសាយណាស់ ជាទូទៅ  
សិស្សជាអ្នកកើតជម្ងឺមុនគេនៅរដូវឆ្លងជម្ងឺ  
ម្យ៉ាងទៀតមេរោគដែលរាលដាលដោយសិស្សមានកម្លាំងឆ្លងខ្ពស់ជាង  
ហើយពេលឆ្លងយូរជាង ដូច្នោះ

សិស្សទាំងឡាយគឺជាអ្នករាលដាលមេរោគគ្រុនផ្តាសាយសំខាន់ៗ។  
ការចាក់វ៉ាក់សាំងជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយសំរាប់សិស្ស  
មិនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយរបស់សិស្ស  
បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃពេទ្យ ថែមទាំងអាចកាត់បន្ថយការរាលដាលនៃវីរុស  
ហើយការពារក្រុមមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រយោល ដូចជាចាស់និងក្មេងៗ  
ដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែល បណ្តាលមកពីគេឆ្លងជម្ងឺ។

**《សមាសធាតុនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយក្នុងឆ្នាំនេះ》**

វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយជាវ៉ាក់សាំងអសកម្មមួយប្រភេទ  
តាមសំណើរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក  
រដ្ឋាភិបាលបានទិញវ៉ាក់សាំង៤ប្រភេទដូចជាបណ្តាប្រទេសលើសកលលោក  
ក្នុងវ៉ាក់សាំងនេះមានធាតុផ្សំវីរុសអសមក្ត ៤ ប្រភេទ គឺប្រភេទ A ២មុខ(H1N1 និង  
H3N2) និងប្រភេទB ១មុខ។ សមាសធាតុ

នៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗបណ្តុះបណ្តាលដោយស៊ីតអំប្រិយ៉ុងមានដែលប្រើប្រាស់នៅ  
ឆ្នាំ(២០២៣)នេះមាន៖ A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus ;  
A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus ; B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria  
lineage)-like virus ; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus ។  
សមាសធាតុនៃវ៉ាក់សាំងនីមួយៗដែលបណ្តុះបណ្តាលដោយកោសិកាមាន៖A/Wiscons  
in/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus ; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus ;  
B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus ; B/Phuket/3073/2013  
(B/Yamagata lineage)-like virus។

**《បរិមាណចាក់វ៉ាក់សាំង រយៈពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនិងរបៀបបង់ថ្លៃ》**

ចំពោះសិស្ស ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង០,៥មីលីលីត្រក្នុងម្តង។ ម្យ៉ាងទៀត  
ចំពោះកុមារមានអាយុតិចជាង(ស្មើនឹង) ៩ឆ្នាំ ប្រសិនបើចាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូង  
គួរតែចាក់ ២ដូស និង ការចាក់២ដូសនេះ ត្រូវចាំរយៈពេលជាង ៤សប្តាហ៍  
រួចចាក់ បើសិនជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ(មិនថា១ដូសឬ២ដូស)  
នៅឆ្នាំនេះចាក់១ដូសក៏បាន។ ចំពោះកុមារមានអាយុលើសពី៩ឆ្នាំ  
មិនថាកន្លងមកធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬទេ សុទ្ធតែត្រូវចាក់១ដូសប៉ុណ្ណោះ។  
ដោយសារវីរុសគ្រុនផ្តាសាយរាល់  
ឆ្នាំមិនដូចគ្នាទេ ដូច្នោះ អ្នកពេញលក្ខណៈចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងជាថ្មី

រៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច យ៉ាងហោចណាស់រងចាំប្រហែល២ សប្តាហ៍ទើបមានសក្តិសិទ្ធិការពារ ហើយឥទ្ធិពលការពារមានរយៈពេលក្នុង១ឆ្នាំ។

យើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតក្នុង ពេលជាមួយគ្នា នៅចំណែកខុសពីគ្នាលើដងខ្លួន

ឬចាក់វ៉ាក់សាំងរងចាំចន្លោះពេលខ្លះ។

វ៉ាក់សាំងដែលផ្តល់ក្នុងឆ្នាំនេះផលិតឬនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន

Adimmune Corporation តៃវ៉ាន់ ក្រុមហ៊ុនSanofi Taiwan Co., Ltd បារាំង

ក្រុមហ៊ុនTTY Biopharm Company Limited

តៃវ៉ាន់និងក្រុមហ៊ុនMedigen Vaccine

Biologics Corporation , MVC

វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនទាំង៤នេះមានប្រសិទ្ធិភាពនិងសុវត្ថិភាពតាម កំណត់ចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្នាំនៃក្រសួងសុខាភិ បាលនិងសុខុមាលភាពអានាម័យតំបន់តៃវ៉ាន់

ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់/នាំចូល

នឹងផ្គត់ផ្គង់តាមលំដាប់ដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវជញ្ជូនដល់ឃ្នាំង។

ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងសំរាប់សិស្សទាំងឡាយក្នុងសាលាជាសមូហភាព

នឹងចាក់វ៉ាក់សាំង, ដូសដោយប្រើប្រាក់រដ្ឋ ហើយមិនបាច់ចំណាយប្រាក់អ្វីទេ

ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកណាមិនអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃបានកំណត់

នោះត្រូវយកលិខិតជូនដំណឹងផ្តល់ដោយសាលា ទៅមន្ទីរពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំង

ហើយបង់ថ្លៃព្យាបាលពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងករណីជាសិស្សចូលបឋមសិក្សាក្រោមថ្នាក់ទី២

ហើយចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងក្រោយពីកើតមក បើសិនចង់ ម្តងទៀត

អាចទៅមន្ទីរពេទ្យចាក់ហើយត្រូវបង់បង់ថ្លៃដោយខ្លួនឯង

ចាក់ដូសទី២បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ នៅសាលាយ៉ាងហោចណាស់៤

សប្តាហ៍។

**《សក្តិសិទ្ធិការពារនៃវ៉ាក់សាំង》**

សក្តិសិទ្ធិការពារនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រែប្រួលតាមអាយុ, ឬ

ស្ថានភាពរាងកាយ អត្រាសក្តិសិទ្ធិគឺ30-80%ជាមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ

លើសពី18ឆ្នាំ បានឆ្លងជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយហើយស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ មានសក្តិសិទ្ធិ

ការពារប្រហែល41% ចំពោះមនុស្សឆ្លងជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយធ្ងន់ធ្ងរ

បានស្នាក់នៅបន្ទប់ថែទាំជាពិសេស មានសក្តិសិទ្ធិការពារដល់ 82%។

ក្មេងៗមានអាយុលើសពី

6ខែដល់យុវជនមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំ

ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ

មានសក្តិសិទ្ធិការពារស្មើនឹងមនុស្សពេញវ័យ។

《កំណត់នៅពេលទទួលវ៉ាក់សាំង》

- I. ចំពោះអ្នកណាបានដឹងថាមានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាសធាតុនៃវ៉ាក់សាំង នោះមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។
- II. ចំពោះអ្នកណាមានប្រតិកម្មអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីមុន នោះមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។

《កំណត់សំគាល់នៅពេលទទួលវ៉ាក់សាំង》

- I. អ្នកជម្ងឺក្លោឌ្លន ឬកំពុងមានជម្ងឺធុនមធ្យម ធុនធ្ងន់ជាបន្ទាន់ គួររងចាំជម្ងឺជាស្បើយសិន រួចចាក់វ៉ាក់សាំងល្អជាង។
- II. ទារកមិនទាន់គ្រប់៦ខែ ដោយសារគ្មានឯកសារអំពីឥទ្ធិពលចាក់វ៉ាក់សាំងនិងសុវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ ដូច្នោះ មិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។
- III. អ្នកណាកើតរោគសញ្ញាGuillain-Barré(GBS)ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងអំឡុងពេល៦អាទិត្យ សូមរកគ្រូពេទ្យវាយតម្លៃសិន។
- IV. អ្នកណាមានប្រតិកម្មចំពោះប្រូតេអ៊ីនក្នុងស៊ុតអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបុគ្គលិកពេទ្យដែលពេញលក្ខណៈសម្បត្តិ ហើយធ្លាប់ដោះស្រាយរោគសញ្ញាប្រតិកម្ម ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវអង្កេតមើលក្នុងរយៈពេល៣០នាទី រងចាំគ្មានរោគសញ្ញាមិនស្រួល ទើបអាចចេញទៅ។
- V. អ្នកដទៃទៀតដែលគ្រូពេទ្យវាយតម្លៃថា មិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំង គឺមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទេ។

《ប្រតិកម្មសន្លប់ពេលចាក់ម្ហូលជាទូទៅពេលកុមារទទួលវ៉ាក់សាំង》

ការសន្លប់ពេលចាក់ម្ហូលតែងតែបណ្តាលមកពីសម្ពាធនិងអារម្មណ៍ភិតភ័យក្នុងចិត្តចំពោះការចាក់ម្ហូល ហើយក្លាយទៅជារោគសញ្ញារាងកាយ ដូចជាវិលមុខនិងចង្កោរភាគច្រើនកើតនៅពេលមានកុមារជាច្រើនទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយគ្នា។ នៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងសំរាប់មនុស្សជាច្រើន ជួនកាលនឹងកើតបាតុភូតដែលមានមនុស្សសន្លប់ជាច្រើន នេះហៅថារោគផ្លូវចិត្តជាសមូហភាព។ ប្រតិកម្មសន្លប់ពេលចាក់ម្ហូលគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងទេ ហើយមិនដែលបង្កជម្ងឺបន្ទាល់អ្វីចំពោះសុខភាពរាងកាយទេ។

យើងស្នើថា មុននឹងចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងកុំទុកពោះឃ្លានយូរពេកនិងចៀសវាងករណីខ្វះទឹក ពេលរង់ចាំចាក់ថ្នាំកុំយូរពេក អាចបន្តអារម្មណ៍ដោយតម្រូវ

ខ្សែភាពយន្តឬនិយាយលេង កាលណាទទួលបានវ៉ាក់សាំង អង្គុយលើកៅអី។  
ម្យ៉ាងទៀត ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវអង្គុយឬដេកសំរាកក្នុងរយៈពេល៣០នាទី  
ដើម្បីជៀសវាងធ្លាក់ចុះនាំឱ្យរបួសដោយសារសន្លប់។

ក្នុងករណីកើតសន្លប់ពេលចាក់ម្ជុល  
ស្នើអ្នកទៅកន្លែងសំរាកៗមួយភ្លែតសិនតាមរបៀបអង្គុយឬដេកអោយរាប  
ហើយបន្ទូរទឹកចិត្តតែងតឹង  
ហើយជូនដំណឹងឱ្យគ្រូពេទ្យ(បើនៅសាលារៀនត្រូវជូនដំណឹងឱ្យគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេ  
ទ្យ)។ បើសិននៅមានបាតុភូតសន្លប់ ត្រូវតែបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាល។

**《សុវត្ថិភាពនិងផលប៉ះពាល់》**

វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ ជាវ៉ាក់សាំងអសកម្មផលិតដោយវិវិសដាប់  
ដូច្នោះយើងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះរួច ក៏មិនកើតជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ។  
ក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង មានលទ្ធភាពបណ្តាលឱ្យចំណែកចាក់ថ្នាំឈឺចាប់ ហើម  
មនុស្សភាគតិចនឹងមានប្រតិកម្មលើរាងកាយទាំងស្រុង ដូចជាក្តៅខ្លួន ឈឺក្បាល  
ឈឺសាច់ដុំ ចង្កោរ ស្បែករមាស់ ជ្រីវងឬសញ្ញាក្រហមជាដើម តាមធម្មតា  
ក្រោយពីកើតរោគសញ្ញា១ដល់២ថ្ងៃក៏ជាសះស្បើយហើយ។ ដូចជាថ្នាំផ្សេងទៀត  
ពិតមែនតែមានករណីភាគតិចតូច

តែវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយក៏មានលទ្ធភាពបង្កើតផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរ  
ដូចជាកើតប្រតិកម្មភ្លាម

រហូតដល់កើតសន្លប់(រោគសញ្ញារួមទាំងពិបាកដកដង្ហើម សម្លេងរអិល ជម្ងឺហឺត  
ភ្នែកឬហើមបបូរមាត់ វិលមុខ ចង្វាក់បេះដូងលោតលឿន។ល។)  
ប្រសិនបើជាអកុសល

រោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលពីរបីឬបីនាទីទៅពីរបីម៉ោងបន្ទាប់  
ពីចាក់វ៉ាក់សាំង។ ហើយមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតបានរបាយការណ៍  
រួមទាំងរោគសញ្ញាប្រព័ន្ធគ្រនៃប្រសាទ(ដូចជា: រលាកប្រសាទដៃ ពិការប្រសាទមុខ  
កន្ត្រាក់ដោយកំដៅខ្ពស់ ពិការប្រសាទ ស៊ីមេទ្រី ដូចជារោគសញ្ញាGuillain-  
Barréជាដើម)

និងរោគសញ្ញានៅប្រព័ន្ធឈាម(ដូចជាThrombocytopeniaបណ្តោះអាសន្ន  
គឺលើស្បែកមានចំណុចពណ៌ស្វាយឬចំណុចឈាម  
កាលណាហូរឈាមពិបាកឃាត់ឈាមជាដើម)។

ក្រៅពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយជ្រូកនៅឆ្នាំ១៩៧៦  
វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយប្រភេទថ្មី H1N1នៅឆ្នាំ២០០៩

និងវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយប្រើនៅរដូវខ្លះ  
ត្រូវអ្នកវេជ្ជសាស្ត្រខាងជម្ងឺឆ្លងបានស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថា  
មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរោគសញ្ញាGuillain-Barré

ករណីផ្សេងទៀតគ្មានស្ថិតិអាចបញ្ជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយទេ។ ម្យ៉ាងទៀត

លក្ខណៈស្រាវជ្រាវធរមាននិងរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថា គ្រឹះមានផ្ទៃពោះដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងអសកម្មក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះមិនដែលបន្ថែមគ្រោះថ្នាក់ដល់ការមានផ្ទៃពោះនិងទារកទេ។

តាមការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្ននេះបានរកឃើញថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយដែលដំណើរការផលិតមានអំប្រិយ៉ុងពងមានសម្រាប់អ្នកដែលមានអាឡែហ្ស៊ីស៊ីត និងមិនប៉ះពាល់ដល់អត្រាកើតប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីទេ សង្គមអន្តរជាតិបានលើកឡើងសំណើថា អ្នកមានអាឡែហ្ស៊ីនឹងពងមានអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយដោយទំនុកទុកចិត្ត។

វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយដែលបានទិញនៅឆ្នាំនេះសុទ្ធតែគ្មានធាតុ Thiomersalate ទេ។

**មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកអ្នក**

**[លិខិតស្នើសុំគ្រូចិត្តទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយ]**

ខ្ញុំបានអានហើយយល់ដឹងពីមានអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយរួចហើយបញ្ជាក់ថាកូនរបស់ខ្ញុំគ្មានគំណាមនៅពេលទទួលបានវ៉ាក់សាំងដូចខាងលើនេះ

ហើយសម្រេចថា កូនរបស់ខ្ញុំ លេខ \_\_\_\_\_ ថ្នាក់ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ \_\_\_\_\_ (ថ្ងៃកំណើតថ្ងៃ \_\_\_\_\_ ខែ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ \_\_\_\_\_ ភេទ៖ ប្រុស ស្រី)

- យល់ព្រមទទួលបានវ៉ាក់សាំង
- មិនយល់ព្រមទទួលបានវ៉ាក់សាំង មូលហេតុ៖ \_\_\_\_\_

ហត្ថលេខារបស់ឪពុកម្តាយ៖ \_\_\_\_\_ (សូមចុះហត្ថលេខាដោយនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនជាភាសាចិន) កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃ \_\_\_\_\_ ខែ \_\_\_\_\_ ឆ្នាំ \_\_\_\_\_

ព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយនិងវិធានការបង្ការពាក់ព័ន្ធសូមមើលរេបសាយរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជម្ងឺ(<http://www.cdc.gov.tw>) ឬហៅទូរស័ព្ទពិសេសលេខ1922ដែលឥតបង់ថ្លៃសំរាប់ប្រជាជនរាយការណ៍ជម្ងឺនិងពិគ្រោះយោបល់។