

ป้องกันการแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
อย่ารับประทานหอยโข่งหรือหอยเชอรี่เป็นๆ
預防感染廣東住血線蟲
不要生吃蝸牛、福壽螺

พยาธิหอยโข่ง

廣東住血線蟲

พยาธิตัวกลมชนิดนี้จะฝังไข่ในตัวหนู และมีหอยโข่ง, หอยทาก หอยน้ำจืดหรือสัตว์ประเภทตัวอ่อนเป็นพาหะนำเชื้อ ซึ่งมนุษย์สามารถถูกแพร่เชื้อได้โดยการรับประทานพาหะนำเชื้อที่ไม่ได้ถูกทำให้สุกก่อน พยาธิตัวกลมชนิดนี้ส่วนมากพบแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในไต้หวันนั้น พบพยาธินี้ในมนุษย์เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1945 และส่วนใหญ่จะพบในเขตเมืองผิงตงและเกาสง ซึ่งในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีรายงานพบการแพร่เชื้อพยาธินี้ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่รับประทานหอยเชอรี่ หอยน้ำจืด(การกินหอยทากในไต้หวันเป็นที่พบบ่อยมากที่สุด) โดยรวมเหตุการณ์การติดเชื้อ。

廣東住血線蟲寄生於大鼠體內，中間宿主為蝸牛、淡水螺、蛞蝓等軟體動物；人因食入未煮熟的中間宿主而感染引發疾病。廣東住血線蟲感染症發生於大洋洲及東南亞。臺灣第一個人類感染個案發生在 1945 年，以往屏東、高雄一帶甚為流行，近年也曾發生外籍勞工生吃淡水螺（在臺灣以食用福壽螺最為常見）而集體感染的事件。

อาการจากการติดเชื้อพยาธิหอยโข่ง

廣東住血線蟲感染症有什麼症狀？

บางรายอาจไม่มีอาการหรือมีอาการออกมาเพียงเล็กน้อย และไม่ยาวนาน ซึ่งบางครั้งอาจมีอาการของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนได้ โดยอาการทั่วไปจะมีอาการเป็นไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ คอแข็ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดแสบตามแขนขาและผิวหนัง ระบบประสาทผิดปกติขั้นร้ายแรงกระทั่งอาการโคม่าหรือเสียชีวิต

有些人不會有症狀，或者是輕微的症狀，但不會持續很久，有時感染會造成腦膜炎（嗜伊紅性腦膜炎），症狀包括頭痛、頸部僵硬、皮膚疼痛或刺激、低度發燒、噁心、嘔吐、神經錯亂等，嚴重的甚至昏迷或死亡。

ระยะเวลาซ่อนตัวของอาการจากการติดเชื้อพยาธิหอยโข่ง

廣東住血線蟲感染症的潛伏期有多長？

ประมาณ 2~3 วัน ; นานที่สุดอาจมีระยะเวลาถึง 47 วัน