

~ 傷寒及副傷寒 โรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์ ~

預防傷寒及副傷寒，勿生飲生食，落實勤洗手的良好衛生習慣。

ป้องกันโรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์ โปรดอย่าดื่ม น้ำ และอาหารดิบ ชัยนล้างมือมีสุขอนามัยที่ดี

什麼是傷寒及副傷寒？

อะไรคือโรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์?

1. 傷寒及副傷寒皆為細菌引起之腸道傳染病，病原菌分別為傷寒桿菌及副傷寒桿菌，人類為主要宿主。

โรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์เกิดจากเชื้อ อแบคทีเรียแพร่ระบาดให้ทางเดินอาหาร เชื้อ อแบคทีเรียของโรคนี้ คือ

Samonella typhi และ **Samonella paratyphi** ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ พบเฉพาะในคน

2. 傷寒及副傷寒為全球性疾病，但多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區。

ผู้ป่วยโรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์มีอยู่ทั่วจักรวาล ส่วนใหญ่จะเกิดที่ประเทศกำลังพัฒนา

โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำ ปรปะปาเข้าไม่ถึงหรือสิ่งแวดล้อมไม่สะอาด

傷寒及副傷寒的感染途徑？

สาเหตุการเกิดโรคไทฟอยด์และโรคไข้ไทฟอยด์?

1. 食入被患者、帶菌者的糞便或尿所污染之食物及飲水。

การกินอาหารและน้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วย

2. 貝類、水果、蔬菜皆可能遭受汙染成為傳染媒介；帶菌者在處理食物時，也可能會污染食品；另外，蒼蠅可能散布病菌於食品中，為傳播媒介之一。

ประเภทหอย ผัก ผลไม้ อาจปนเปื้อนเชื้อ อและกลายเป็นตัวแพร่ระบาดที่ติดเชื้อ อไปทำอาหาร ก็อาจแพร่เชื้อ อเข้าไปในอาหารได้ แมลงวันอาจแพร่เชื้อ อไปยังอาหาร ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวแพร่เชื้อ อหลัก

3. 國外亦有經由性行為傳染的病例報告。

ต่างประเทศยังมีผลการวิจัยออกมาว่าสามารถแพร่เชื้อ อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้

傷寒及副傷寒的常見症狀？

อาการของโรคไทฟอยด์และโรคไข้ไทฟอยด์?

1. 罹患傷寒或副傷寒常見症狀有：持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、便秘或腹瀉、相對性心律減慢、脾臟腫大、身軀出現紅疹等。

อาการที่พบได้บ่อยคือ: เป็นไข้อย่างต่อเนื่อง ปวดหัว ไม่สบาย ไม่อยากทานอาหาร เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องผูก หรือท้องร่วง การเต้นของหัวใจช้าลง ม้ามโต ออกผื่นตามร่างกายเป็นต้น

2. 副傷寒之症狀較輕，致死率也較低。

อัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่อนข้างน้อย

傷寒及副傷寒的潛伏期有多長？

ระยะเวลาฟักตัวของโรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์?