

居家式托育服務(保母)因應 COVID-19 防疫作為建議注意事項

項目	注意事項
感染管制教育訓練	1. 地方政府或居家托育服務中心加強辦理實體或線上教育訓練，使居家保母了解疫情現況、我國現階段相關規定、於何處查閱相關最新資訊與指引、以及手部衛生、呼吸道衛生/咳嗽禮節、環境清潔消毒、疑似個案送醫之防護等感染管制措施。
自主防疫管理措施	2. 居家保母、同住成員及嬰幼兒家長下載台灣社交距離 APP，確實掌握是否具有 COVID-19 感染風險。
	3. 居家保母、同住成員及嬰幼兒屬居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，不可提供及使用服務。
	4. 定期詢問及記錄嬰幼兒及其同住成員之 TOCC，以評估是否具有 COVID-19 感染風險。
	5. 有發燒或疑似呼吸道感染症狀者，應佩戴口罩。
	6. 管制訪客人數，於門口協助訪客進行體溫量測及執行手部衛生，備有訪客紀錄，記載來訪日期、來訪對象、訪客姓名、聯絡資料及其相關 TOCC 與有無發燒等疑似感染症狀等資訊。並限制具 COVID-19 感染風險或發生疑似感染症狀之家長、接送者及訪客進入。
	7. 落實居家保母、同住成員及嬰幼兒每日體溫量測及健康狀況監測，若有肺炎或出現發燒（耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 或額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ）、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常或不明原因腹瀉等疑似 COVID-19 症狀或類流感症狀時，應主動向居家托育服務中心報告，並採取適當的防護措施及治療。
	8. 縮短接送流程與時間，避免逗留或降低進出室內的頻率。嬰幼兒送托及接回後，落實相關消毒清潔程序。
	9. 居家保母、同住成員及嬰幼兒若有發燒及健康狀況異常，且經評估接受採檢，請依「COVID-19 採檢後應注意事項」，自採檢醫院返家後，如仍有症狀，應留在家中，不可外出。
環境衛生空間規劃	10. 每日以適當消毒劑(如：1,000ppm 漂白水)消毒經常接觸的工作環境表面，如：門把、手推車、工作台、餐桌、更換尿布台、嬰兒床欄、兒童遊戲設施及玩具等，並視使用情形增加廁所及浴室衛生清潔及消毒頻率。
	11. 設有充足洗手設備(包括洗手台、肥皂或手部消毒劑、酒精性乾洗手液)，並注意隨時補充乾洗手液或肥皂、擦手紙等相關耗材，及提醒嬰幼兒落實手部衛生行為。
	12. 維持用餐環境良好通風，使用專屬餐具，避免共食，並於每次用餐完畢後，進行用餐環境清潔。
	13. 清潔用具與托兒用品於使用完畢後應清潔消毒；清潔用具如抹布、拖把要經常清潔、消毒並定期更換。

項目	注意事項
	<p>14. 每週盤點個人防護裝備、手部衛生用品、環境清潔消毒用品等防疫相關物資存量，儘量維持至少可提供1個月所需的安全庫存量。</p> <p>15. 預先規劃居家保母、同住成員及嬰幼兒暫時就地安置所需之隔離空間，隔離空間應與其他嬰幼兒距離至少2公尺以上，遠離用餐區、通風良好、容易清潔消毒。</p>
疑似案例應變處置	<p>16. 居家保母知悉或發現自身、同住成員、嬰幼兒有抗原快篩或PCR檢驗結果為陽性者，應於24小時內通報居家托育服務中心，再由該中心通報社會局(處)(如附表)。</p> <p>17. 聯繫衛生局或撥打1922，依指示至指定社區採檢院所就醫或返家等候，且禁止自行搭乘大眾運輸工具前往醫院或篩檢站。</p>
確診病例應變處置	<p>18. 居家保母提供服務期間，知悉自身、同住成員、嬰幼兒有確診者，應立即通知居家托育服務中心與社會局(處)，並配合衛生主管機關或防疫人員之疫調、匡列、隔離、採檢等防疫措施，疫調時應如實陳述執業收托狀況，禁止自行搭乘大眾運輸工具前往醫院或篩檢站。</p> <p>19. 任1名(含)以上居家保母、同住成員或嬰幼兒為確診病例，應如實告知保親雙方，並即暫停服務。暫停服務期間為最後1例確診病例離開該托育服務地點次日起10日。</p> <p>20. 出現確診病例後，進行環境清潔消毒作業；恢復服務前，應再次進行環境清潔消毒作業。</p> <p>21. 曾確診個案如需使用或提供服務，應符合以下「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」之一：</p> <p>(1) 同時符合「退燒至少1天，且症狀緩解」、「距發病日已達10天(無症狀者，發病日以採檢日計算)」、「呼吸道檢體SARS-CoV-2病毒核酸檢驗結果為陰性或Ct值≥ 30」等3項條件解除隔離治療，並完成7天自主健康管理者。</p> <p>(2) 同時符合「退燒至少1天，且症狀緩解」及「距發病日已達10天(無症狀者，發病日以採檢日計算)」2項條件，並由衛生單位開立居家隔離通知書，續進行7天居家隔離者，則無須檢驗陰性證明。</p>

資料來源：托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引。

註1：消毒水泡製方法：

1,000ppm (1:50) 消毒水係以1公升清水加入20c.c.漂白水。

5,000ppm (1:10) 消毒水係以1公升清水加入100c.c.漂白水。

註2：有關具感染風險民眾追蹤管理機制等相關防疫措施與規範，將依據疫情發展適時檢討調整，公布於疾病管制署全球資訊網 (<https://www.cdc.gov.tw/>)，請上網參閱或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

附表、居家式托育服務(保母)COVID-19 抗原快篩或 PCR 檢驗陽性通報單 (範例)

通報日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

保母姓名：_____ 聯絡電話：_____

托育地址：_____ 縣/市 _____

保母總人數：_____ 服務對象總人數：_____

	個案姓名	人員類別	身分證字號 /居留證號	年齡	病毒核酸檢驗採檢院所 名稱	安置場所 (如仍於托育場所內，請註明地點)
1						
2						
3						
4						

※保母發現抗原快篩或 PCR 檢驗陽性之個案請於 24 小時內填具本表回傳轄屬居家托育服務中心及社會局(處)，並盡速取得病毒核酸檢驗報告。