

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

1/2

莫德納雙價疫苗(原型株+BA.1)擴及12至17歲追加劑使用

- 11/1起提供**12-17歲青少年接種**(包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者)
- 追加劑與上1劑(包含基礎劑最後1劑、基礎加強劑、第1次追加劑)等接種間隔至少為3個月(12週，84天)以上

莫德納雙價疫苗(原型株+BA.4-5)作為追加劑使用

- 10/26經食藥署審核通過適用**12歲以上**，後續視疫苗供應情形提供12歲以上民衆作為追加劑接種使用

接種作業實施時間，指揮中心將依食藥署核准情形、疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排另行公布

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

2/2

5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑

- 若Pfizer-BNT單價疫苗經食藥管署核准適用於5-11歲兒童追加劑接種後，提供5-11歲兒童追加劑接種
- 後續若莫德納雙價疫苗核准適用於6-11歲兒童追加劑後，提供已完成接種莫德納或Pfizer-BNT基礎劑，以及已接種單價Pfizer-BNT追加劑之6-11歲兒童使用；滿5歲且未滿6歲兒童，建議以單價Pfizer-BNT疫苗完成追加劑接種
- 追加劑接種間隔調整為至少3個月(12週，84天)以上

接種作業實施時間，指揮中心將依食藥署核准情形、疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排另行公布