日期：2019 年第 18–19 週 (2019/4/28–5/11)　　DOI：10.6524/EB.201905_35(10).0002

疫情概要：

我國持續發生麻疹病例，且鄰近國家疫情持續，國內病例數仍可能增加，惟不至於出現大規模流行疫情。近期全國腸病毒就診人次逐漸上升，惟尚未達流行閾值；社區腸病毒型別以克沙奇 A 型為多，腸病毒 71 型以輕症及散發病例為主。今年登革熱境外移入病例數為近 10 年同期最高，近一個月個案感染地以東南亞國家為主。

今年全球麻疹疫情較往年嚴峻，近期美國及越南疫情持續、香港發生群聚；中國大陸及香港腸病毒疫情上升；東南亞多數國家登革熱疫情上升且處流行期；尼泊爾及阿曼分別出現 H5N1 流感及 H9N2 流感病例，基於當地可能具感染風險，我國 5/6 提升該二國新型 A 型流感旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

一、麻疹

(一) 國內疫情

1. 今年截至 5/13 累計 92 例（含 14 起群聚），高於 2015–2018 年同期病例數；其中 62 例為國內感染（44 例為接觸者），另 30 例為境外移入，感染國家為泰國 9 例、越南 8 例、菲律賓 6 例、中國大陸 2 例，香港、日本、印尼、緬甸及韓國各 1 例。
2. 個案以 20–39 歲為多（佔 76%）。
3. 目前監測中 1,625 人，最後監測至 5/28。



圖一、2018–2019 年麻疹確定病例趨勢

(二) 國際疫情

1. **美國**
   (1) 疫情持續，今年至 5/10 累計 23 州確診 839 例，為該國自 1994 年以來最高；病例主要集中於紐約州布魯克林區。
   (2) 近期尚有密西根州、紐澤西州、加州、喬治亞州、馬里蘭州及賓州發生群聚事件。
2. **日本**：今年至 5/5 累計報告 467 例，為 2009 年以來同期最高；分布以大阪府為多，其次為東京都及三重縣，逾 5 成病例為 20–39 歲。
3. **香港**：5/10–5/13 新增 5 例，其中 3 例屬同一群聚案，為尖沙嘴購物商場同一店鋪員工;今年至 5/13 累計 72 例,為 1998 年以來同期最高，病例中 29 例為機場工作人員。
4. **越南**：河內市疫情持續，今年至 5/12 該市累計報告 1,193 例，高於去年同期。
5. **泰國**：疫情略降，今年至 5/6 累計報告約 2,600 例（10 例死亡），發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高。

二、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：我國第 19 週全國健保腸病毒門急診就診計 7,151 人次，近期呈逐漸上升趨勢，尚未達流行閾值（10,500 就診人次，圖二）。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 2 例腸病毒感染併發重症病例，感染腸病毒 D68 型及克沙奇 B5 型；今年截至 5/13 累計 8 例，分別感染為腸病毒 71 型 4 例、腸病毒 D68(EVD68)型 2 例、克沙奇 A10 型及克沙奇 B5 型各 1 例；去年累計 36 例（含 8 例死亡），以感染伊科病毒 11 型 12 例、EV71 型 8 例為多。
3. 近 4 週社區檢出腸病毒型別以克沙奇 A 型為多；今年截至 5/13 計 40 例腸病毒 71 型，其中 4 例重症。

圖二、2018-2019 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情

累計數 / 國家	疫情趨勢	2019年		備註
		截止點	報告數(死亡數)	
中國大陸	上升	5/5	356,138(4)	與2016-18同期均值相當
香港	上升，處基線值	5/4	急診就診千分比:1.2	高於2017-18同期
韓國	處相對低點	5/4	門診就診千分比:6.3	高於2017-18同期
日本	處相對低點	5/5	定醫平均報告0.34	高於去年同期
新加坡	上下波動，低於閾值	5/4	9,827	低於去年同期
泰國	處相對低點	5/5	10,430(0)	

三、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例：今年截至 5/13 累計 1 例，個案居住於高雄市，感染登革病毒第二型。
2. 境外移入病例：今年截至 5/13 累計 136 例，個案感染地以東南亞國家為主，以印尼 48 例及越南 30 例為多；境外移入病例數仍為近 10 年同期最高。

(二) 國際疫情

趨勢 / 國家	疫情趨勢	2019年		
		截止點	報告數(死亡數)	備註
菲律賓	持平	4/20	67,106(277)	高於去年同期
越南	持平，超過流行閾值	5/5	57,880(3)	高於2012-16平均
馬來西亞	略升，處流行期	5/13	47,147(71)	高於去年同期
泰國	上升	5/7	19,503(25)	高於2016-18同期
寮國	上升，處高峰期	4/26	2,405 (8)	高於2013-18同期
新加坡	上升，超過警戒值	5/4	2,942	高於2017-18同期
斯里蘭卡	處相對低點	5/13	16,681	
中國大陸	處相對低點	3/31	295	

1. **馬爾地夫**：疫情持續，今年 1–4 月病例數為 422–518 例，今年截至 5 月初累計報告逾 1,900 例，高於 2016–2018 年同期。
2. **柬埔寨**：疫情持續上升且超過流行閾值，今年累計報告約 5,300 例。

四、伊波拉病毒感染疫情－剛果民主共和國

(一) 自 2018 年 5/11 至 2019 年 5/12 累計 1,705 例（1,617 例確診、88 例極可能），其中 1,124 人死亡。由於居民對醫護人員不信任及攻擊事件頻傳，使 4 月為此次疫情最嚴重之月份。

(二) 世界衛生組織(WHO)於今年 5/9 評估維持剛果民主共和國國內及區域傳播風險為非常高，國際為低。

(三) WHO 於 5/7 因應疫情持續及實驗性疫苗(rVSV-ZEBOV)庫存量減少，修改疫苗接種策略建議，包括減少接觸者每劑接種劑量及擴大接種對象。剛果民主共和國自 2018 年 8/8 起已累計 114,553 人接種實驗性疫苗。

五、人類新型 A 型流感

(一) H5N1 流感

1. **尼泊爾**：WHO 於 5/2 公布尼泊爾確診該國首例，亦為自 2017 年以來全球首例；為鄰近首都加德滿都之中南部地區(Kavrepalanchok)21 歲男性，3/24 住院，3/29 死亡。
2. **全球**：自 2003 年以來累計 861 例，其中 455 例死亡，病例以埃及為多，其次為印尼及越南。

(二) H9N2 流感

1. **阿曼**：WHO 於 5/3 公布阿曼通報該國首例，為北部南巴提奈省(South Batinah) 13 個月大女童，3/17 發病，4/1 出院；個案住家周圍有包括養雞在內之養殖場。
2. **全球**：本季累積 7 例，分布於阿曼及中國大陸廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、雲南省及江蘇省；自 2013 年迄今累計 37 例（其中 1 例死亡），多為輕症，呈散發，以中國大陸 30 例最多。

(三) 基於阿曼及尼泊爾當地具感染風險，我國 5/6 提升該二國新型 A 型流感旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區		等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型流感	中國大陸	廣東省、安徽省、 福建省、北京市、 廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、 雲南省、內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市， 不含港澳、**尼泊爾、阿曼**		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	**2019/5/6**
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、緬甸 南亞地區 1 個國家：斯里蘭卡		第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的 一般預防措施	2016/8/16

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
麻疹	亞洲：中國大陸、日本、菲律賓、越南、泰國、印尼、印度、哈薩克、以色列 非洲：剛果民主共和國、獅子山、奈及利亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、烏克蘭、希臘、英國、塞爾維亞、法國、喬治亞、俄羅斯 美洲：委內瑞拉、巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/3/7
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家：阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2015/12/1
茲卡病毒感染症	亞洲 6 國、美洲 21 國／屬地、大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/12/5
	亞洲 6 國、美洲 21 國、非洲 10 國、大洋洲 2 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/12/5
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/8/15
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/2/12

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984 年 12 月 15 日　　**發 行 人**：周志浩
出版機關：衛生福利部疾病管制署　　**總 編 輯**：林詠青
地　　址：臺北市中正區林森南路 6 號　　**執行編輯**：陳學儒、李欣倫
電　　話：(02) 2395-9825　　**網　　址**：http://www.cdc.gov.tw/
文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]