

Taiwan V-Watch 症狀統計 成人追加劑

資料區間 March 22, 2021至June 21, 2022

疾病管制署



TAIWAN CDC

Taiwan V-Watch

- Taiwan V-Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。主動監測國人接種緊急使用授權之不同廠牌疫苗常見的不良反應，或可能發生的不良事件
- **成人V-Watch:** 成人接種基礎劑/追加劑且於現場掃描QR code之V-Watch註冊者，各廠牌COVID-19疫苗收前3萬名為主動追蹤對象
- **兒童與青少年V-Watch:** 2022年5月3日開啟，經由父母或監護人關切未成年子女接種後狀況，並透過手機代為填寫健康回報。以各廠牌前6萬名註冊者為主動追蹤對象。加入方式請參考
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA
- 藉由完整填寫健康回報，除了讓個人自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有身體不適請及時就醫評估
- 不論是否加入V-Watch，當接種者發生疑似接種後嚴重不良事件，**皆需藉由醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」**，啟動後續關懷與追蹤

疾病管制署



TAIWAN CDC

接種後七日內常見症狀

追加劑 (第三劑) 為Moderna、BNT、高端者


疾病管制署 TAIWAN CDC

V-Watch 主動追蹤人數—Moderna

基礎劑1
26,006人

基礎劑2
21,127人


追加劑 (3劑同廠牌)
12,580人




V-Watch 資料區間 March 22, 2021 – June 21, 2022

疾病管制署 TAIWAN CDC


1. 注射部位疼痛 (Moderna)




2. 注射部位腫脹 (Moderna)




3. 疲倦 (Moderna)




4. 肌肉痠痛 (Moderna)




5. 頭痛 (Moderna)




6. 發冷 (Moderna)



7. 發燒 (Moderna)





8. 嗜睡 (Moderna)



追加劑（第三劑）為Moderna者— 基礎劑為同廠牌或不同廠牌

三劑同廠牌
12,580人

有一劑非同廠牌
35,310人




V-Watch 資料區間 March 22, 2021 – June 21, 2022

疾病管制署 TAIWAN CDC

追加劑接種 三日內

追加劑 Moderna






疾病管制署 TAIWAN CDC

V-Watch 主動追蹤人數—BNT

基礎劑1
23,820人

基礎劑2
14,004人


追加劑 (3劑同廠牌)
4,017人




V-Watch 資料區間 March 22, 2021 – June 21, 2022

疾病管制署 TAIWAN CDC


1. 注射部位疼痛 (BNT)




2. 注射部位腫脹 (BNT)




3. 疲倦 (BNT)



4. 肌肉痠痛 (BNT)





疾病管制署 TAIWAN CDC




追加劑 (第三劑) 為BNT者 — 基礎劑為同廠牌或不同廠牌

三劑同廠牌
4,017人

有一劑非同廠牌
10,564人



追加劑接種 三日內




疾病管制署 TAIWAN CDC

V-Watch 主動追蹤人數—高端

基礎劑1
27,587人

基礎劑2
21,175人


追加劑 (3劑同廠牌)
6,996人




V-Watch 資料區間 March 22, 2021 – June 21, 2022

疾病管制署 TAIWAN CDC


1. 注射部位疼痛 (高端)




2. 注射部位腫脹 (高端)




3. 疲倦 (高端)




4. 肌肉痠痛 (高端)




5. 頭痛 (高端)




6. 發冷 (高端)



7. 發燒 (高端)





8. 嗜睡 (高端)



追加劑（第三劑）為高端者— 基礎劑為同廠牌或不同廠牌

三劑同廠牌
6,996人

有一劑非同廠牌
2,130人




V-Watch 資料區間 March 22, 2021 – June 21, 2022

疾病管制署 TAIWAN CDC

追加劑接種 三日內

追加劑 高端



疾病管制署 TAIWAN CDC

追加劑（第三劑）接種後七日內常見症狀

- ◆ 追加劑的七日內接種後身體不適，為三日內與七日內各回報一次（不同於基礎劑每日回報七天）
- ◆ 追加劑接種後七日內全身性症狀以疲倦、肌肉酸痛、頭痛、嗜睡常見；局部不適以注射部位疼痛及注射部位腫脹常見
- ◆ 同樣的追加劑廠牌，當追加劑與基礎劑廠牌相同（homologous booster，三劑同廠牌）或追加劑與基礎劑廠牌不同（heterologous booster）相較，初步觀察到追加劑接種後，與基礎劑同廠牌者，其局部或全身不適發生比例大多會低於與基礎劑不同廠牌者
- ◆ 追加劑相較於基礎劑之接種後局部或全身不適，並未明顯上升



國內COVID-19疫苗安全性參考資訊連結

1. COVID-19疫苗不良事件通報摘要
<https://www.fda.gov.tw/TC/SITELIST.ASPX?SID=1571>
2. COVID-19疫苗統計資料
<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9jFXNbCe-sFK9ElmRRi2Og>
3. 台灣COVID-19疫苗接種後不良事件通報
<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGfkg>
4. Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA



Thank you!