

日期:2019 年第 33–35 週 (2019/8/11–8/31)

DOI:10.6524/EB.201909_35(17).0002

疫情概要：

全國腸病毒門急診就診人次持續上升，以中南部上升幅度較為明顯，目前仍處流行高峰期；近 4 週社區腸病毒檢出型別以克沙奇 A 群為多，腸病毒 71 型持續活動。雙北出現登革熱本土病例，南高新增零星個案，另我國北部新增屈公病本土病例。北部新增麻疹群聚案，累計 10 例，監測至 9/20。

鄰近我國之泰國、香港、韓國、中國大陸及日本腸病毒疫情處高峰或流行期；東南亞及南亞登革熱疫情仍處高峰，且病例數多高於近年同期。中國大陸北京市出現 H5N6 流感病例，該市新型 A 型流感旅遊疫情建議已列為第二級警示(Alert)；我國今年 7 月以來累計 30 餘例自緬甸移入屈公病病例，顯示當地感染風險快速升高，8/26 提升該國屈公病旅遊疫情建議至第二級警示。

一、腸病毒

(一) 國內疫情

1. 腸病毒就診人次：第 35 週全國腸病毒門急診就診計 18,452 人次，較第 34 週上升 10.7%，以中南部縣市上升幅度較明顯；目前仍處流行高峰期。
2. 腸病毒感染併發重症：新增 8 例，感染腸病毒 71 型 (EV71 型) 7 例、克沙奇 A6 型 1 例；今年累計 34 例，以感染 EV71 型為多 (25 例)，其他分別感染腸病毒 D68 型、克沙奇 A6 型、克沙奇 A10 型各 2 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 B5 型及伊科病毒 11 型各 1 例。
3. 近 4 週社區腸病毒型別以克沙奇 A 群為多，EV71 持續活動；今年累計 286 例 EV71 型個案，高於 2016 至 2018 年同期。



圖一、2018–2019 年腸病毒門急診就診人次趨勢

(二) 國際疫情


國家	累計數	疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
			截止點	報告數(死亡數)	
泰國		上升，處高峰	8/26	43,292(0)	高於2016-18同期
香港		處高峰	8/24	急診就診千分比:3.4	高於2017-18同期
韓國		下降，處高峰	8/24	門診就診千分比27.9	高於2014-18同期
中國大陸		下降，處流行期	8/25	1,421,004(16)	
日本		下降，處流行期	8/25	定醫平均報告2.75	高於2018同期
馬來西亞		高於平均值	8/24	41,029(0)	
新加坡		低於閾值	8/24	日平均病例數:16	

二、登革熱

(一) 國內疫情

1. 本土病例

- (1) 新增 9 例，其中台南市 4 例、高雄市及新北市各 2 例、台北市 1 例；國內今年累計 77 例，分別為高雄市 51 例（三民區 37 例，前鎮區、鳳山區及左營區各 3 例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各 1 例）、台南市 22 例（東區 9 例、中西區 4 例、南區 3 例、安南區 2 例，永康區、左鎮區、新化區及北區各 1 例）、新北市 2 例（中和區、永和區）、桃園市 1 例（中壢區）、台北市 1 例（大安區）。
 - (2) 台南市東區崇明里及崇德里 2 個群聚區監測期滿，中西區（開山里）與東區（大同里、泉南里、東門里）群聚區新增個案，持續監測中；另北區為有病例之新增行政區。
 - (3) 高雄市群聚區均已監測期滿；另左營區新里別出現病例，仁武區為有病例之新增行政區，感染地為台南市。
 - (4) 台北市出現該市首例本土病例；新北市出現本土群聚事件。
2. 境外移入病例：今年累計 352 例，為近 10 年同期最高，90% 以上感染地為東南亞國家；近一個月新增個案感染國家以菲律賓、柬埔寨及越南為多。



圖二、2018-2019 年登革熱病例通報趨勢


(二) 國際疫情

國家	趨勢 疫情趨勢	2019年		備註 (近一週病例數與往年相比)
		截止點	報告數(死亡數)	
菲律賓	上升·處高峰	8/10	逾208,000(逾900)	高於去年同期
馬爾地夫	上升·處高峰	8/6	3,310	高於2016-18同期
越南	處高峰	8月初	近130,000(16)	高於2012-16平均及去年同期
斯里蘭卡	處高峰	9/2	42,909	高於2010-16及去年同期
寮國	處高峰	8/2	20,357(45)	高於2014-18同期
馬來西亞	下降·處高峰	9/2	91,460(125)	高於去年同期
泰國	下降·處高峰	8/26	77,575(81)	高於2016-18同期
柬埔寨	下降·處高峰	8/2	近46,000	高於2012-18同期
新加坡	下降·處高峰	9/2	11,212	高於2015-18同期
中國大陸	上升·處流行期	8/4	2,970(0)	高於2014-18同期

1. 印尼：萬隆市(Bandung)今年截至 6 月累計約 1,900 例，高於去年同期（約 1,800 例）；廖內群島省巴丹島(Batam)截至 8 月中累計 535 例，以 7 月份新增 91 例為單月最高，且該月份新增數高於 2016–18 年同期。
2. 印度：南部卡納塔克邦(Karnataka)疫情上升，近 3 個月新增約 8,000 例，今年已累計 9,300 餘例，並以首府班加羅爾(Bangalore)近 6,000 例為多。

三、屈公病

- (一) 國內疫情：新增 23 例，其中 1 例為本土病例，個案居住於新北市中和區，另 22 例為境外移入個案，感染國家以緬甸 18 例為最多。國內今年累計 2 例本土病例（新北市中和區及土城區）；另有 52 例境外移入病例，感染國家為緬甸 34 例、泰國 8 例、馬爾地夫 5 例、印尼 2 例，菲律賓、馬來西亞及印度各 1 例。今年屈公病病例數為自 2007 年 10 月列入法定傳染病以來歷年最高。
- (二) 我國今年自 7 月以來已出現 34 例自緬甸移入病例，顯示當地感染風險快速升高，8/26 將該國屈公病旅遊疫情建議由第一級注意(Watch)提升至第二級警示(Alert)。




圖三、2007–2019年屈公病確定病例發病趨勢

四、麻疹

(一) 國內疫情

1. 今年累計 123 例，高於 2015–2018 年同期病例數；其中 76 例為國內感染（55 例為接觸者），另 47 例為境外移入，感染國家以越南 17 例、泰國 12 例及菲律賓 7 例為多；出國目的以旅遊 25 例最多，其次為商務及探親。
2. 個案年齡層以 20–39 歲為多（佔 76%）。
3. 今年累計 17 起群聚，最後監測至 9/20。

- (二) 國際疫情：我國鄰近國家之麻疹疫情多呈下降趨勢，惟泰國疫情持續，今年累計報告 4,300 餘例，高於去年同期。紐西蘭疫情亦持續上升，今年累計逾 900 例確診，高於 2006 年來全年總數，病例主要分布於北島奧克蘭區。



圖四、2018–2019 年麻疹確定病例趨勢

五、人類新型 A 型流感—H5N6 流感

- (一) 中國大陸：出現今年首例，為北京市 59 歲女性，8/11 住院，病情嚴重，曾有禽類相關接觸史。本季（2018 年 10 月迄今）累計 3 例；前 2 例為去年 10 月於廣西壯族自治區及江蘇省各發生 1 例，個案均已死亡。
- (二) 全球：自 2014 年迄今累計 24 例，均發生於中國大陸，為散發病例，以廣東省 7 例為多，餘分布於湖南省、雲南省、四川省、安徽省、江西省、湖北省、廣西壯族自治區、福建省、江蘇省及北京市等。
- (三) 目前新型 A 型流感旅遊疫情建議為第二級警示(Alert)地區包含廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省、內蒙古自治區。

六、旅遊疫情建議等級

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
新型 A 型 流感	中國 大陸 廣東省、安徽省、福建省、 北京市、廣西壯族自治區、 江蘇省、湖南省、雲南省、 內蒙古自治區	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/4/5
	中國大陸其他省市，不含港澳 尼泊爾、阿曼	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/5/6
登革熱	東南亞地區 9 個國家： 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、 菲律賓、寮國、越南、柬埔寨、 緬甸 南亞地區 3 個國家：斯里蘭卡 、馬爾地夫、印度	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/6/18
麻疹	亞洲：中國大陸、菲律賓、越南、 泰國、印尼、緬甸、印度、 哈薩克、以色列、土耳其 非洲：剛果民主共和國、奈及利 亞、幾內亞、馬達加斯加 歐洲：義大利、羅馬尼亞、 烏克蘭、英國、法國、喬治亞、 俄羅斯、波蘭、北馬其頓共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/7/17
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症 (MERS-CoV)	沙烏地阿拉伯	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2015/6/9
	中東地區通報病例國家： 阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、 伊朗、阿曼、科威特	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/9/30
小兒麻痺症	巴基斯坦、阿富汗、奈及利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2015/11/30
茲卡病毒 感染症	亞洲 7 國、美洲 21 國／屬地、 大洋洲 3 國／屬地、非洲 2 國	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/2
	亞洲 5 國、美洲 28 國／屬地、 非洲 11 國、大洋洲 10 國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2019/8/2
拉薩熱	奈及利亞、貝南共和國	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2018/2/13
黃熱病	巴西	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/1/17
霍亂	葉門、索馬利亞	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一 般預防措施	2017/8/15

粗體字：建議等級調整

(續上頁表格) 國際間旅遊疫情建議等級表

疫情	國家／地區	等級	旅行建議	更新日期
白喉	印尼、葉門	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2017/12/26
伊波拉病毒感染	剛果民主共和國	第二級 警示(Alert)	對當地採取加強防護	2018/5/15
德國麻疹	日本、中國大陸	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/6/19
屈公病	緬甸	第二級 警示(Alert)	對當地採取 加強防護	2019/8/26
	泰國、印度、馬爾地夫	第一級 注意(Watch)	提醒遵守當地的一般預防措施	2019/8/26

粗體字：建議等級調整

創刊日期：1984年12月15日

出版機關：衛生福利部疾病管制署

地址：臺北市中正區林森南路6號

電話：(02) 2395-9825

文獻引用：[Author].[Article title].Taiwan Epidemiol Bull 2019;35:[inclusive page numbers].[DOI]

發行人：周志浩

總編輯：林詠青

執行編輯：陳學儒、李欣倫

網址：<http://www.cdc.gov.tw/>