



Moderna (Spikevax) COVID-19 疫苗

單價疫苗及雙價疫苗之外觀/劑量/使用比較表

111/12/30 版

劑型	雙價疫苗 (原型株/Omicron)		單價疫苗 (原型株)	說明
	BA.1	BA.4/5	0.1mg/mL	
適用年齡 /適應症	≥12 歲之追加接種		≥6 個月~<11 歲基礎劑	
外盒包裝	<p>綠框/綠色字體</p> <p>10 瓶/盒</p>  	<p>灰框/藍色字體</p> <p>10 瓶/盒</p>  	<p>紫框/紫色底白字</p> <p>10 瓶/盒</p>  	<ul style="list-style-type: none"> 未使用前置於原包裝盒內避光冷儲

劑型	雙價疫苗 (原型株/Omicron)		單價疫苗 (原型株)	說明
	BA.1	BA.4/5	0.1mg/mL	
瓶身外觀				
瓶蓋	藍蓋	藍蓋	藍蓋	
英標品名	spikevax 0.10 mg/mL 0 / 0	Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent Original and Omicron BA.4/BA.5	spikevax 0.10 mg/mL	
容量	2.5ml 	2.5ml 	2.5ml 	

劑型	雙價疫苗 (原型株/Omicron)		單價疫苗 (原型株)	說明
	BA.1	BA.4/5	0.1mg/mL	
每劑含量 / 每劑接種 劑量	50mcg/0.5ml/劑 (25mcg 原病毒株+25mcg Omicron BA.1) ✓12 歲以上追加劑	50mcg/0.5ml/劑 (25mcg 原病毒株+25mcg Omicron BA.4/BA.5) ✓12 歲以上追加劑	50mcg/0.5ml/劑 ✓滿 6 歲至 11 歲基礎劑	<ul style="list-style-type: none"> 採肌肉注射
		25mcg/0.25ml/劑 ✓滿 6 歲至 11 歲追加劑	25mcg/0.25ml/劑 ✓滿 6 個月至 5 歲基礎劑	
接種時程	<p style="text-align: center;">追加劑</p> <p style="text-align: center;">與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑 間隔 12 週以上</p>		<p style="text-align: center;">基礎劑</p> <p style="text-align: center;">2 劑間隔 4-8 週以上</p>	<ul style="list-style-type: none"> 即將滿 6 歲或即將滿 12 歲，其第 1、2 劑介於不同年齡劑量之兒童，建議其接種間隔依前一劑接種時之規範接種，接種劑量則以接種當下年齡依仿單建議劑量接種 以雙價疫苗完成追加劑接種後，目前不建議再以單價疫苗作為後續追加劑接種

劑型	雙價疫苗 (原型株/Omicron)		單價疫苗 (原型株)	說明
	BA.1	BA.4/5	0.1mg/mL	
冷儲條件 /效期	<p>➢ -50~-15°C 冷凍儲存 9 個月, 如外盒/瓶身標示效期</p> <p>➢ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C 可冷儲 30 天 (詳見盒裝標籤標示使用期限)</p> <p>➢ 未開瓶安定性 8°C~25°C : 24 小時</p> <p>➢ 已開瓶疫苗 2°C 至 25°C 環境下, 盡量於 12 小時內使用完畢, 至多不超過 19 小時。</p>			<ul style="list-style-type: none"> • 避光儲存, 解凍後不能再冷凍 • 開瓶前應檢查小瓶內液體是白色到米白色 • 如有變色或其他微粒物質, 不能使用 • 疫苗原廠效期可能採「月/日/年」或「日/月/年」標示, 以疾病管制署下貨之 Email 通知及 NIIS 所載批號效期為準, 如有疑問請洽轄區衛生局/所