

Bagaimana mencegah Disentri Amuba?

Jawab:

1. Bagi yang ada gejala atau dites positif silakan segera berobat, dan perhatikan secara khusus untuk mencuci tangan sebelum makan, setelah ke toilet.
2. Memperhatikan kebersihan tangan dan kebersihan makanan, harus makan makanan matang dan minum air yang telah dimasak mendidih, air limbah rumah tangga harus ditangani dengan baik.
3. Mencegah makanan terkontaminasi, gunakan penutup kasa untuk mengisolasi makanan atau buah yang telah dikupas kulitnya, menghindari kontak dan kontaminasi oleh vektor penyakit (misalnya: lalat, kecoa).
4. Hindari perilaku kontak mulut dengan anus.

Pekerja migran asing menderita Disentri Amuba, apakah bisa menerima pengobatan di Taiwan?

Jawab:

1. Pemeriksaan kesehatan pekerja migran asing yang tidak memenuhi syarat dan termasuk disentri amuba, dalam waktu 65 hari sejak hari berikut menerima bukti pemeriksaan kesehatan harus bekerja sama dengan investigasi epidemi unit kesehatan, membayar sendiri obat untuk pengobatan dan 1 bulan setelah menyelesaikan pengobatan melakukan pemeriksaan ulang (dalam 7 hari dites 3 kali, setiap kali berselang minimal 24 jam), sewaktu ketiga tes semuanya negatif oleh Badan Pengendalian Penyakit, pemeriksaan tersebut dianggap memenuhi syarat.
2. Bagi yang belum menangani berdasarkan peraturan yang disebutkan di depan, akan dianggap pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi syarat, dinas kesehatan setempat akan menerbitkan surat tidak disetujui, dan memberitahukan Departemen Tenaga Kerja (mencabut izin kerja) dan Badan Imigrasi Departemen Dalam Negeri (melakukan catatan dibatasi untuk masuk ke wilayah Taiwan).

